

FOLIT® Síra

800 SC

Čistý
objem:

10 l

Obsah živín: 57% hm., tj. 800 g/l elementární síra

Číslo vzájomného uznania v ČR: V332

OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKOV:

Spĺňa zákonom stanovené limity (mg/kg pomocné látky) v ČR: Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 20,0; Cr ≤ 50,0.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Folit® Síra je určená k aplikácii na list k odstráneniu deficitu síry v pôde a k pokrytiu zvyšných nárokov na príjem síry niektorými plodinami, hlavne intenzívne pestovanými olejninami a obilninami.

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

Folit® Síra sa aplikuje postrekom ako doplnková výživa v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín. Nepoužívať v prípade silného slnka, vysokých teplôt a silného vetra. Pri stanovení konkrétnej aplikačnej dávky v rámci odporúčaného rozmedzia je vhodné vychádzať z predchádzajúcich rozborov rastlín alebo pôd, dlhodobej znalosti výživových pomerov stanovišťa, predplodiny, kvality a úrovne základného hnojenia, rastovej fázy plodiny a klimatických podmienok. Nižšie dávky volíme pri slabšom deficite alebo pre delené aplikácie.

SKLADOVANIE

Hnojivo skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, mrazom a ohňom. Hnojivo je pri dodržovaní predpísaných podmienok skladovania a užívania stabilné, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám a nevolňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto pri presnom dodržiavaní predpísaných aplikačných podmienok nehrozí pri použití hnojiva nebezpečie ohrozenia životného prostredia. Hnojivo je nehorľavé. Pri požiari je povolené použiť všetky hasiace médiá. V prípade použitia vody zaistíte, aby kontaminovaná hasebná voda neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spodných vôd a recipientov vôd povrchových.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pred použitím bandasku pretrepte pre získanie homogénnej suspenzie. Za súčasného použitia všetkých prípustných komponentov v nádrži postrekovača (v 2/3 objemu naplneného vodou), pri zapnutom miešadle rozpustíte v následnom poradí: síran horečnatý, močovina, rozriedený Folit® Síra (1 liter hnojiva v 5 litroch vody), rozriedené ďalšie listové hnojivo aj pesticíd podľa návodu na jeho použitie. Nádrž doplňte vodou. Aplikačnú kvapalinu spotrebujte hneď po zmiešaní a postrek aplikujte pri stále zapnutom miešadle.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

H315 Dráždi kožu. **P280** Noste ochranné rukavice PVC/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P302 + P352** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. **P332 + P313** Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Dodržiňte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.



Používať iba v prípade skutočnej potreby! Neprekračovať odporúčané dávkovanie!

Plodina	Dávkovanie	Termín aplikácie	Počet aplikácií
	(l/ha)		
Repka olejná	3,0–6,0	jar: po obnovení vegetácie, pred kvetom vo fáze zeleného pupeňa, po odkvete jeseň: vo fáze vytvárania listovej ružice (5–8 listov)	2–4
Obilniny	3,0–6,0	jeseň: fáza 3–4 listov jar: po obnovení vegetácie do konca odnožovania, vo fáze stĺpkovania až začiatku metania	1–3
Kukurica	4,0–6,0	fáza 4–6 listov, fáza 8–10 listov, 7–10 dní od posledného postreku	2–3
Cukrová repa	3,0–6,0	od 4–8 listov pred uzatvorením meziriadkov	1–2
Zelenina	3,0–6,0	hlúbková a cibulová zelenina, hrach, fazuľa: odporúčajú sa preventívne postreky ostatné druhy: odporúča sa preventívny postrek alebo v okamihu zisteného nedostatku síry	1–2
Jabľoň	3,0–6,0	vo fáze rastu zárodokov plodov, 10–14 dní po prvom postreku, vo fáze vývoja plodov	1–3

Folit® Síra 800 SC je zaradený v zozname vzájomne uznaných výrobkov pod číslom 951 pre územie SR.

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZVÝŠKOV

Prázdne obaly od hnojiva, pracovné nástroje a pomôcky vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby bolo dosiahnuté minimálneho odporúčaného riešenia hnojiva pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte iba na ošetrovanom pozemku. Takto vypláchnuté obaly možno uložiť do separovaného odpadu. Zbytky ďalej už nepoužitého hnojiva (akokoľvek znehodnoteného), ako aj obaly znečistené nepoužiteľným hnojivom patria do nebezpečného odpadu, sa nesmú dostať do kanalizácie a vodovodov a je nutné ich odovzdať na miestach k tomuto účelu určených orgánmi štátnej správy alebo do zariadení k odstraňovaniu nebezpečných odpadov.

Dátum výroby, číslo šarže:

CHEMAP
AGRO®

Dovozca: Chemap Agro s.r.o.,
Kochanovce 217, 066 01 Kochanovce
tel.: +420 466 670 941

Doba použiteľnosti: 36 mesiacov odo dňa výroby.

Výrobca: Zaklady Chemiczne „Siarkopol“ TARNOBREZEG Sp. z o.o.



VAROVANIE

