# HERGIT®

ČESKÝ VÝROBEK

Čistý objem: **10 l**

Číslo rozhodnutia o registrácii: 1005

## Silný v olejninách!

**Vysoko účinný stimulátor rastu s posilneným regeneračným účinkom s prvoradým uplatnením v repke olejnej, maku a slnečnici.**

**HERGIT** je pomocný rastlinný prípravok používaný ako stimulátor rastu rastlín s proti stresovým účinkom. Je určený pre zvýšenie kvality a výnosu semien, plodov i hľúz kultúrnych rastlín.

### CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

**Zloženie:** Kyselina 2-aminobenzoová 12,5 g/l
Kyselina 2-hydroxybenzoová 6,5 g/l
Kyselina 2-amino-pentandiová/1,5/ 6,0 g/l

**Obsah rizikových prvkov:**
**Splňuje zákonom stanovené limity (mg/kg pomocnej látky):**
Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 10,0; Cr ≤ 50,0. Včely – PR, ryby – PR.

**Druh úpravy prípravku:**
SL – Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou.

### DÁVKOVANIE

**HERGIT** sa dávkuje v dávke **0,2 l/ha** zriedený pri pozemnej aplikácií **200 až 400 l/ha** vody. Postrek možno kombinovať s listovými hnojivami, fungicídmi, insekticídmi a selektívnymi herbicídmi (po konzultácii s dodávateľmi).

### REGISTROVANÉ APLIKÁCIE

| | |
|---|---|
| **Repka olejná** | T1: od 5. pravého listu do konca predlžovacieho rastu (DC 15–39).<br>T2: vo fázy butonizácie, žltý pupeň (DC 50–59).<br>T3: od konca kvetu do konca vývinu šešúl (DC 69–79). |
| **Mak siaty** | T1: vo fáze 5 pravých listov až do konca predlžovacieho rastu (DC 15–39).<br>T2: prvé korunné lupene viditeľné (začiatok kvitnutia) až 10% v kvete (DC 59–61). |
| **Kukurica-zrno** | T1: od fázy 6 listov do konca predlžovacieho rastu (DC 16–39).<br>T2: od fázy začiatku metania metlín do konca kvitnutia (DC 51–69). |
| **Slnečnica** | T1: v období 5 listov až do konca predlžovacieho rastu (DC 15–39).<br>T2: objavenie pupeňa (fáza hviezdy ) až plný kvet (DC 51–65). |
| **Cukrová repa** | T1: od 3 páru listov do zapojenia porastu (DC 23–45).<br>T2: od 2–8 týždňov po zapojení porastu (DC 47–49). |
| **Obilniny ozimné** | T1: od fázy 5 listu po koniec steblovania (DC 15–35).<br>T2: pri objavení posledného listu do začiatku klasenia (DC 37–51).<br>T3: po odkvitnutí (DC 69–71). |
| **Obilniny jarné** | T1: začiatok odnožovania až koniec steblovania (DC 21–35).<br>T2: pri objavení posledného listu do začiatku klasenia (DC 37–51).<br>T3: po odkvitnutí (DC 69–71). |
| **Zemiaky** | T1: tvorba pupeňov až koniec kvitnutia (DC 51–69). |

### POUŽITIE MIMO DOPORUČENÉ TERMÍNY – REGENERÁCIA RASTLÍN

Po dlhodobej perióde chladu i nedostatku slnečného svitu (zamokrenie), sucha, prípadne i k odstráneniu pesticídneho šoku v kombinácií so selektívnymi herbicídmi.

Používať iba v prípade skutočnej potreby.
Neprekračovať doporučené dávkovania.

### LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZVYŠKOV

Zvyšky postrekovej tekutiny alebo výplachovej vody nesmú zasiahnuť zdroje i recipienty povrchových vôd. Zvyšky v obale sa likvidujú výplachom vodou, ktorá sa použije pri následnej príprave tekutiny. Zvyšky postrekovej kvapaliny sa vlejú do ryhy vyhĺbenej na ošetrovanom pozemku a nechajú sa vsiaknuť. Obaly a použité náradie a nástroje i ochranné pomôcky sa asanujú prostriedkami na výplach postrekovačov (napr. SAGROL NF) a zmyjú sa vodou. Prázdne obaly sa recyklujú.

### BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

**P280** Používajte ochranné rukavice PVC/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný tvárový štít. **P301+P312** PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte lekára. **P305+P351+P338** PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. **P337+P313** Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku starostlivosť.

**Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.**

### PRVÁ POMOC

**Pri požití** – vypiť 0,5 l vlažnej vody s 10 tabletami medicinálneho uhlia.
**Pri zasiahnutí očí** – vyplachovať prúdom vlažnej vody po dobu 15 minút.
**Pri zasiahnutí pokožky** – odstrániť zasiahnutý odev a pokožku omyť mydlom a vodou.

Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia je treba postihnutému zaistiť lekárske ošetrenie.

### PODMIENKY SKLADOVANIA

**HERGIT** sa skladuje v pôvodných dobre uzavretých obaloch, v suchých skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami, pred priamym slnečným žiarením a sálavým teplom.

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby.

Dátum výroby, číslo šarže:

PN 01-100-07

8 594033 600105


Výrobca:
**BIOSFOR s.r.o.**
Slepotice 36
530 02 Pardubice 2
**www.biosfor.eu**

Výhradný distribútor:
**CHEMAP AGRO s.r.o.**
Dašice 475, 533 03
tel.: +420 466 670 941
**www.chemapagro.sk**


BIOSFOR Pardubice

CHEMAP AGRO