

# APIS 200 SE

APIS 200 SE® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.

APIS 200 SE je insekticíd vo forme suspenznej emulzie (SE) s kontaktným a požerovým účinkom, určený proti žravým a cicavým škodcom zemiakov, repky ozimnej, rajčiakov, a jabloní.

## ÚČINNÁ LÁTKA:

acetamiprid 200 g/l

## BALENIE:

5 l HDPE kanister

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Acetamiprid, účinná látka prípravku APIS 200 SE, je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant

(blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

Aplikácia proti šeuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrovanou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!

### Repka ozimná:

**Dávka vody:** 300 l/ha

**Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie :** 1 ×

Prípravok aplikujte v čase objavenia sa škodcu na porastoch repky, od fázy zeleného púčika do fázy plného kvitnutia (BBCH 51-65).

**Odporúčané postrekovanie:** kvapky strednej veľkosti

### Zemiak:

**Dávka vody:** 300 l/ha

**Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie :** 1 ×

Postrekujte v čase kladenia vajčiek a hromadného liahnutia sa lariev (od BBCH 35, keď 50% rastlín v riadku je zapojených až do BBCH 62, keď 20% kvetov v 1. vrcholíku je otvorených). Ošetrovanie možno v prípade dlhodobých náletov škodcu zopakovať s prípravkom z inej chemickej skupiny

**Rajčiak:****Dávka vody:** 500-600 l/ha**Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie :** 1 x

Postrekujte v čase, keď 80 % plodov má typickú farbu plnej zrelosti (BBCH 88).

**Odporúčané postrekovanie:** kvapky strednej veľkosti**Jabloň****Dávka vody:** 800 l/ha**Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie:** 2 x, interval medzi aplikáciami je 10-21 dní.

Prípravok aplikujte v čase dozrievania plodov (BBCH 71-77).

**Odporúčané postrekovanie:** kvapky strednej veľkosti

Postrek proti škodcom (najmä cicavým) musí byť urobený tak, aby všetky časti rastlín boli rovnomerne pokryté postrekovou kvapalinou.

Prípravok používajte pri teplotách do 20 °C. Pri vyšších teplotách pripravok aplikujte podvečer.

**VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY**

V prípade, ak je nutná skoršia likvidácia plodiny, následné plodiny pestované v priebehu vegetačného obdobia, počas ktorého bol už skôr použitý prípravok na ochranu rastlín APIS 200 SE, neošetríte prípravkami obsahujúcimi acetamiprid.

**Postrek nesmie zasiahnuť susediace kultúry!****NÁVOD NA POUŽITIE**

| Plodina      | Účel použitia                           | Dávka/ha | Ochranná doba | Poznámka                       |
|--------------|-----------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|
| repka ozimná | blyskáčik repkový,<br>krytonos šešuľový | 0,2 l    | 39            | max. 1x                        |
| zemiak       | larvy a chrobáky<br>pásavky zemiakovej  | 0,1 l    | 7             | max. 1x                        |
| rajčiak      | molica skleníková                       | 0,25 l   | 3             | Použitie v skleníku<br>max. 1x |
| jabloň       | obaľovač jablčný                        | 0,3 l    | 14            | max. 2x                        |

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.