

## Téma: Ozimná pšenica – fungicídna ochrana vlajkového listu a klasu

Vážený pestovateľ,

posledné výdatnejšie zrážky nám vliali optimizmus ale aj obavy z rizika zvýšenia infekčného tlaku hubových chorôb. Porasty ozimných obilnín v závislosti na ich skorosti sa nachádzajú v štádiách vlajkového listu až klasenia. Práve tieto fázy sú veľmi dôležité pre dosiahnutie kvalitnej úrody a vystihnutie správneho termínu fungicídneho zásahu.

Špeciálne pre toto ošetrenie sme pripravili v tomto roku kombináciu účinných látok **tebuconazole a prochloraz** vo fungicídnom balíčku prípravkov: **BUKAT 500 SC + MIR-BELLA 45 EC (10 l + 20 l)**.

Pre zvýšenie využiteľnosti N a tvorbu bielkovín v zrne odporúčame spoločnú aplikáciu s fungicídmi prípravkov **FOLIT THIOSULF 760 SL alebo AKTIFOL SULF 825 SL** s obsahom síry **v thiosíranovej forme**. AKTIFOL SULF obsahuje ešte špeciálny „AMIX“ KOMPLEX pre podporu účinku aplikovaných fungicídov.

Porasty pre klasením je ešte možné regulovať prípravkom **KOREKT 510 EC (ethefon)** samostatne alebo v TMixe s prípravkom **FLORONE**.

**Pripomíname, že práve prípravok FLORONE v samostatnej aplikácii je možné aplikovať i na vyklasený porast bez rizika úrodovej korekcie**

### 1. FUNGICÍDNA OCHRANA OZIMNEJ PŠENICE

#### **BUKAT 500 SC**

tebuconazole 500 g/l  
hrdze, fuzariózy, černe


+

#### **MIR-BELLA 450EC**

prochloraz 450 g/l  
septoriózy

Pre získanie ceny ha ošetrenia špeciálne pre Vás a ďalších výhodách kontaktujte agronomický servis.

Spoločná aplikácia oboch prípravkov pokrýva široké spektrum najdôležitejších chorôb v období vlajkového listu až začiatku kvitnutia obilnín ako sú – septoriózy, hrdze, fuzariózy klasu, černe.



V prípade výskytu lariev kohútika odporúčame aplikáciu prípravku **DELCAPS 050 CS (delthametrin)** v dávke **0,1 l/ha**.

## 2. POSLEDNÁ MOŽNOSŤ MORFOREGULÁCIE PORASTOV OBI LNÍ

### KOREKT 510 SL 0,4 l/ha + FLORONE 0,4 l/ha

- aplikácia v ozimnej pšenici vo fáze BBCH 37-39, v jačmeni BBCH 37-45
- aplikácia pre skrátenie posledného internódia pod klasom
- pozitívny vplyv prípravku FLORONE na výšku a kvalitu úrody
- **úspora 5% pri nákupe balíčka 10 l + 10 l**

### FLORONE 0,4 l/ha

- možná aplikácia i na vyklasený porast
- spevnenie posledného internódia
- bez rizika úrodovej korekcie




Pšenica ozimná v optimálnej fáze pre aplikáciu, foto: lokalita Nitra

## 3. ZVÝŠENIE KVALITATÍVNYCH PARAMETROV ZRNA PŠENICI OZIMNEJ

### fungicíd + Folit ThioSulf 760 SL 1,5 – 2,0 lt/ha (5,34 – 7,12 EUR/ha)

- podpora využitia dusíka a tvorbu bielkovín
- zvýšenie N látok
- zvýšenie kvalitatívnych parametrov zrna



### fungicíd + Aktifol SULF 825 SL 2,0 lt/ha (13,02 EUR/ha)

- podpora využitia dusíka a tvorbu bielkovín
- zvýšenie N látok
- zvýšenie kvalitatívnych parametrov zrna
- podpora systémových fungicídov
- rozšírenie systémových fungicídov v rastline