

BOROFYT 150

Tekuté listové hnojivo ako kvapalný koncentrát stopového prvku bór.

HNOJIVO ES

Typ hnojiva: E.1.1.d Borethanolamin

BALENIE:

20 l kanister

ZLOŽENIE:

B 11% hm

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Používa sa k preventívnemu alebo kuratívne mu odstraňovaniu nedostatku využiteľného bóru v rastlinách. Pri kuratívnej aplikácii formou postreku na list odstraňuje fyziologické anomálie spôsobené nedostatkom tohto prvku v rastline. Preventívne sa aplikuje do porastov na stanovištiach s vysokým deficitom bóru. Preventívne aplikácii možno odporučiť aj u kultúr náročných na dostatočnú zásobu bóru.

K takto náročným plodinám patria: repka, mak, slnečnica, cukrová repa, krmná repa, ovocie, okrasné kvety.

Najvhodnejšie použitie je začiatkom vegetácie po olistenie kultúr. Od tejto doby možno hnojivo aplikovať v 14 denných intervaloch. V čase kvitnutia hnojivo priaznivo pôsobí na prerastaníu peľu a tým aj na tvorbu semien a plodov. Hnojivo je možné aplikovať po celú dobu vegetácie.

DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE

Plodina	Obdobie aplikácie	Dávkovanie v l/ha	Počet aplikácií
Repka ozimná	1. aplikácia: na jeseň, BBCH 13-14	3	1
	2. aplikácia: na jar, BBCH 30 do butonizácie	3	1
Cukrová repa	1. aplikácia: po dokončení tvorby listovej ružice 2. aplikácia: v 14 denných intervaloch	3	2
Jadroviny, kôstkoviny	1. aplikácia pri otváraní pupeňov, 2. a 3. aplikácia v intervale 14 dní	2	2-3
Vinná réva	1. aplikácia pri otváraní pupeňov, 2. pri kvitnutí a 3. pri raste plodov	3	3