

FLORONE

Produkt získaný z hydrolyzovaných bielkovín rastlinného pôvodu v spoločnej formulácii so základnými NPK živinami a mikroelementami.

REGISTRÁCIA:

Zaradené do zoznamu vzájomne uznaných výrobkov pod číslom 970

BALENIE:

5 l kanister

ZLOŽENIE

voľné aminokyseliny – 4%, cytokiníny – 0,03%, organický materiál – 8%, celkový dusík (N) – 1%, fosfor vo forme oxidu (P_2O_5) – 10%,

draslík vo forme oxidu (K_2O) – 10%, bór (B) – 0,25%, molybdén (Mo) – 0,20%

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

FLORONE je tekutý prípravok hnedej farby obsahujúci aminokyseliny rastlinného pôvodu, obohatený o základné NPK živiny a stopové prvky B a Mo. Prípravok

pôsobí ako inhibítor vegetatívneho rastu. Aplikáciou na rastliny vytvára lepšie podmienky pre kvitnutie a nasadenie plodov vedúce k zvýšeniu úrody.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Obilniny

Florone spevňuje a zosilňuje bunkové steny, bráni poliehaniu obilnín. Veľkou prednosťou je možná aplikácia v neskorých fázach rastu bez negatívneho vplyvu na výnos a kvalitu zrna. Odporúčané dávky u obilnín sú 0,2 – 0,4 l/ha s ohľadom na stav porastu a s prihliadnutím k aktuálnemu počasiu. V intenzívne sa vyvíjajúcich porastoch potrebuje partnera.

Ozimné obilniny

Aplikácia v rastovej fáze BBCH 31-32 Florone 0,4 l/ha + RETABELLA 750 SL 0,7 – 1,0 l/ha

Jarné obilniny

Aplikácia v BBCH 37-39 FLORONE 0,4 l/ha + KOREKT 510 SI 0,4 l/ha.

Strukoviny

Florone zvyšuje nasadenie kvetných pukov a následne strukov plodiny. Aplikácia sa vykonáva od výšky porastu 15-20 cm. Po aplikácii prípravok inhibuje vegetatívny rast, skracuje vzdialenosti jednotlivých internódií a spevňuje porast ako celok. Výsledkom je kompaktný porast s vyšším počtom nasadených strukov.

Hrach, sója

Aplikácia od výšky porastu 15-20 cm do začiatku kvitnutia v dávke 0,2 l/ha.

Repka ozimná

Prípravok je vhodný pre jesennú morforeguláciu repky s výraznou podporou koreňa. Pri intenzívnych podmienkach pestovania a dobrých vlhových podmienkach je vhodné pripravok doplniť s prípravkom RETABELLA 750 SL v dávke 1,5 l. Dávka prípravku FLORONE je 0,4 l/ha.

Cukrová repa

Aplikácia prípravku pred zberom cukrovej repy pre zvýšenie cukornatosti. Minimálny časový odstup od aplikácie do zberu by mal byť aspoň 30 dní. Dávka prípravku FLORONE 0,4 l/ha.

Ovocné stromy

Skrátenie letorastov, vyrovnanosť kvetenstiev a následné rovnomernejšie dozrievanie plodov.

VÝSLEDKY POKUSOV**Ozimnej pšenici, Ditana 2016/2017**

ODRODA ETANA Variant ošetrenia	Výnos	
	t/ha	%
BBCH31 Florone 0,3	11,10	114
KONTROLA	9,72	100

Jarný jačmeň, Ditana 2016/2017

ODRODA ETANA Variant ošetrenia	Výnos	
	t/ha	%
KONTROLA	7,74	100
BBCH 39 Florone 0,4 + Cerone 0,4	8,93	115
BBCH 39 Florone 0,4	8,36	108