

MIRABELLA 450 EC

Postrekový fungicídny širokospektrálny prípravok vo forme emulgovateľného koncentráту s lokálne systémovým účinkom na ochranu obilnín proti hubovým chorobám listov a klasov, proti steblolamu a na ochranu okrasných rastlín proti fuzariózam s preventívnym a eradikátnym účinkom.

ÚČINNÁ LÁTKA:

prochloraz 450 g/l

BALENIE:

5 l HDPE kanister

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Prochloraz je širokospektrálna fungicídna účinná látka s lokálne - systémovým účinkom, takže preniká do rastlinných pletív, avšak do neošetrených častí rastliny nie je rozvádzaná. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu. Ničí široké spektrum pôvodcov hubových chorôb obilnín, napr. chorôb spôsobujúcich steblolam

(*Pseudocercospora herpotrichoides*), septoriózy (*Septoria nodorum*, *Septoria tritici*), fuzariózy (*Fusarium* spp.), rynchospóriovú škvrnitosť (*Rhynchosporium secalis*), hnedú škvrnitosť jačmeňa (*Pyrenophora teres*) a ďalšie.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo postrekovej kvapaliny: 200 - 400 l/ha.

Obilniny – steblolam

miraBELLA 450 EC ničí R/W typy steblolamu (*Pseudocercospora herpotrichoides*) vrátane izolátov rezistentných k benzimidazolovým fungicídom. Krížová rezistencia medzi benzimidazolmi a prochlorazom doteraz nebola zaznamenaná. Termín ošetrovania: pri prvých príznakoch, obvykle vo fáze BBCH 30-32.

Pšenica – septorióza pšeničná, septorióza plevová

Prípravok miraBELLA 450 EC aplikujte v dobe vývoja vlajkového listu až do doby, kedy je úplne vyvinutý klas (BBCH 39-59).

Jačmeň - listové škvrnitosti

Ošetrovanie sa robí v dobe výskytu uvedených chorôb, obvyčajne v priebehu steblovania až do začiatku kvitnutia (BBCH 29-59).

Okrasné rastliny

miraBELLA 450 EC je vhodný na morenie hlúz a cibúl okrasných rastlín proti hubovým chorobám, zvlášť proti fuzariózam. Morenie sa robí po dobu 15 - 20 min. tesne pred výsadbou.

Miešateľnosť

Prípravok miraBELLA 450 EC je miešateľný s väčšinou bežne používaných herbicídov (vrátane fenoxykyselín), insekticídov, fungicídov a s kvapalným hnojivom DAM 390.

Základným predpokladom pre kombinácie je zhoda optimálnych aplikačných termínov pre miraBELLA 450 EC a druhý prípravok. Pri aplikácii zmesí odporúčame nepoužívať dolnú hranicu dávkovania vody a počas aplikácie udržiavať miešanie trvale v prevádzke. Odporúčame vopred urobiť skúšku miešateľnosti oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii s použitím miestnej vody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná	stebloľam, septoriózy pšenice	1 l/ha	42 dní	(TM) Agrovital
		1 l/ha + (0,3 l/ha)		
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	42 dní	(TM) Agrovital
		1 l/ha + (0,3 l/ha)		
raž ozimná, tritikale, jačmeň ozimný	stebloľam	1 l/ha	42 dní	(TM) Agrovital
		1 l/ha + (0,3 l/ha)		
okrasné rastliny (hlúzy, cibule)	fuzariózy	0,4 %	AT	

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.