

# TRISTAR 50 SG

TRISTAR 50 SG® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.

Herbicídny prípravok vo forme granúl rozpustných vo vode, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale a jačmeni jarnom.

## ÚČINNÁ LÁTKA:

tribenuron – methyl 500 g/kg

## BALENIE

300 g HDPE fľaša

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

TRISTAR 50 SG je selektívny herbicíd so systémovým účinkom. Je prijímaný listami a transportovaný do rastových vrcholov, kde brzdí delenie buniek a zabraňuje rastu a vývoju burín. Rýchlo sa rozkladá v pôde, čo obmedzuje jeho prijímanie cez korene. Prípravok ničí mnoho druhov jednoročných dvojklíčnolistových

burín. Prvé známky herbicídneho účinku sú viditeľné už po niekoľkých dňoch a buriny odumierajú po 2 - 4 týždňoch od aplikácie. Najvyššiu účinnosť pôsobenia zaručuje aplikácia prípravku na mladých burinách vo fáze intenzívneho rastu.

## SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

### Pšenica ozimná, tritikale

#### TRISTAR 50 SG 30 g/ha

**Citlivé buriny:** kapsička pastierska, veronika roľná, hviezdica prostredná, nevädza poľná

**Stredne citlivé buriny:** pichliač roľný, fialka roľná, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý

#### TRISTAR 50 SG 40 g/ha

**Citlivé buriny:** pichliač roľný, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý

**Stredne citlivé buriny:** fialka roľná

#### TRISTAR 50 SG 25 g/ha (Tank Mix HERBISTAR 200 EC)

**Citlivé buriny:** hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý, veronika roľná, lipkavec obyčajný

**Stredne citlivé buriny:** fialka roľná

**Jačmeň jarný****TRISTAR 50 SG 25 - 30 g/ha**

**Citlivé buriny:** kapsička pastierska, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, nevädza poľná

**Menej citlivé buriny:** fialka roľná, peniažtek roľný, mrlík biely, parumanček nevoňavý, nevädza poľná, hluchavka objímavá, fialka roľná, lipkavec obyčajný.

**POKYNY PRE APLIKÁCIU**

**Dávka vody:** 200 - 300 l/ha

**Maximálny počet aplikácií:** 1x v plodine, na jar

**Pšenica ozimná, tritikale**

TRISTAR 50 SG aplikujte vo fáze 2 - 6 pravých listov burín (BBCH 12 - 16). Na ničenie lipkavca používajte kombinácie s prípravkami so špecifickým účinkom na lipkavec. Pre zlepšenie účinku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom ADJUVINN v súlade s návodom na použitie. Rastová fáza plodín v dobe aplikácie: plné odnožovanie až 2. kolienko (BBCH 26 - 32).

**Jačmeň jarný**

TRISTAR 50 SG aplikujte vo fáze 2 - 4 pravých listov burín (BBCH 12 - 14). Pre zlepšenie účinku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom ADJUVINN v súlade s návodom na použitie. Rastová fáza plodiny v dobe aplikácie: začiatok odnožovania až 1. kolienko (BBCH 21 - 31) Prípravok nepoužívajte: na rastliny poškodené mrazom, suchom, stojacou vodou, škodcami a na rastliny s príznakmi nedostatku živín, spoločne s hnojivami na list.

**VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY**

V prípade zaorania obilniny ošetrenej prípravkom TRISTAR 50 SG je možné ako náhradnú plodinu vysievať iba obilninu. Pri použití zmesi rešpektujte údaje výrobcu prípravku, ktorý je v zmesi použitý!

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín, vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

| Plodina                         | Účel použitia                                       | Dávka/ha      | OD | Poznámka         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----|------------------|
| <b>Pšenice ozimá, tritikale</b> | pichliač roľný, jednoročné dvojkličnolistové buriny | 30 – 40 g     | AT |                  |
|                                 | jednoročné dvojkličnolistové buriny, lipkavec       | 25 g + 0,35 l | AT | HERBISTAR 200 EC |
| <b>Jačmeň jarný</b>             | jednoročné dvojkličnolistové buriny                 | 25 – 30 g     | AT |                  |

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.