

Téma: Ochrana repky proti šešulovým škodcom

Vážený pestovateľ,

Vegetácia sa nám výrazne posunula dopredu a v tomto období nie je možné nájsť pole repky ozimnej bez kvetu. Mnohí z Vás vykonali základné insekticídne ošetrenia pred kvitnutím a rozhodujete sa o možnom zásahu **proti šešulovým škodcom**, hlavne krytonos šešulový a byľomor kelový.

S ohľadom na ochranu včiel je nevyhnutné používať prípravky, ktoré vykazujú prijateľné riziko pri aplikácii a samozrejme aplikáciu v bezletovom čase.

Z nášho portfólia tieto parametre spĺňa prípravok **APIS 200 SE** s obsahom účinnej látky acetamiprid. Nespornou výhodou prípravku je jeho tekutá formulácia, dlhodobé pôsobenie v poraste a plne systémový účinok. Insekticídny zásah je vhodné spojiť i s fungicídnym zásahom, z nášho portfólia **NORIOS – azoxystrobín 250 g/l** proti bielej hnilobe a černej repkovej.

I keď mierne v predstihu by sme Vám radi pripomenuli využitie **tiosíranov** pri neskoršej ochrane repky proti plesni kapustovej, múčnatke a iným patogénom, ktoré často napádajú repky 4-6 týždňov pred zberom. Aplikáciou tiosíranov vytvárame **tzv. nehostinné prostredie pre vyklíčenie spór patogéna**. Aplikáciu tiosíranov je vhodné spojiť s lepením repky a pridaním roztoku močoviny do 10%.

V našom portfóliu okrem zavedeného prípravku Folit Thiosulf 760 SL nájdete i novinku tohto roku uvádzanú pod obchodným názvom **THIOFIX SULF** s rovnakým obsahom tiosíranov.

Odporúčanie insekticídnej ochrany proti šešulovým škodcom:

APIS 200 SE 0,2 l/ha + Norios 1,0 l/ha

- aplikácia proti šešulovým škodcom repky ozimnej
- autorizovaná dávka 0,2 l/ha
- tekutá formulácia prípravku
- dlhodobé pôsobenie v poraste
- plne systémový účinok prípravku



Odporúčanie pre aplikáciu tiosíranov spoločne s lepením repky:

Na základe odporúčania pracovníkov SZPO, ktoré odzneli na seminároch, kde ako jedna alternatíva neskoršej ochrany repky ozimnej proti plesni kapustovej, múčnatke a iným patogénom bola spomenutá aplikácia tiosíranov. Aplikáciu je vhodné doplniť roztokom močoviny a prípravkom s obsahom účinnej látky pinolene.

Účelom zásahu je vytvoriť nehostinné prostredie pre vyklíčenie spór patogéna.

Thiofix Sulf /Folit Thiosulf 760 SL 1,5 – 3,0 lt/ha + močovina do 10% + pinolene 0,7 lt/ha