



**Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme emulzie typu olej:voda (EW), určený na ošetrovanie ozimných obilnín proti steblolamu, septoriózam, rynchospóriovej škvrnitosti, hnedej škvrnitosti jačmeňa a hnedej prúžkovitosti jačmeňa.**

**ÚČINNÁ LÁTKA:**

prochloraz 450 g/l (39,82 % hm)

**BALENIE:**

5 l COEX HDPE kanister

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ENNOBE EW je fungicíd s lokálne systémovým účinkom, preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaný do

neošetrovaných častí rastliny. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### Ošetrovanie proti steblolamu:

Ošetríte pri prvých príznakoch choroby, obvyčajne vo fáze keď je 1. kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom do štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 31-39). ENNOBE EW ničí steblolam (*Pseudocercospora herpotrichoides*) a ničí aj kmene rezistentné k benzimidazolovým fungicídom. Krížová rezistencia medzi benzimidazolmi a prochlorazom nebola doposiaľ pozorovaná.



### Ošetrovanie proti septoriózam:

Ošetrovanie vykonávajte od štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný až do štádia konca klasenia: klas celkom vyrastený (BBCH 39-59).



### **Ošetrovanie proti hnedá škvrnitosť jačmeňa, hnedá prúžkovitosť jačmeňa a rynchospóriová škvrnitosť:**

Ošetrovanie vykonávajúte obyčajne pri prvom výskyte príznakov choroby, od štádia keď je 1. kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom, do štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 31-39).



## **VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY**

Po aplikácii prípravku ENNOBE EW nie sú známe negatívne účinky na následné, náhradné a susediace plodiny. Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na okolité porasty!

## **NÁVOD NA POUŽITIE**

| Plodina                        | Účel použitia                                                                              | Dávka/ha | Ochranná doba | Poznámka |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|
| <b>pšenica ozimná</b>          | septorióza pšenice, septorióza plevová, steblolam                                          | 1 l      | 35 dní        |          |
| <b>jačmeň ozimný</b>           | hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, steblolam | 1 l      | 35 dní        |          |
| <b>raž ozimná, ovos ozimný</b> | steblolam                                                                                  | 1 l      | 35 dní        |          |
| <b>tritikale</b>               | septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam                                          | 1 l      | 35 dní        |          |