

FERTISILINN

KREMÍK A MIKROŽIVINY

Kvapalnú produkt obsahujúci
kremík a stopové prvky prijateľné
rastlinami

Mo

Si

Cu

B

Zn

Si

inniso
Better chemistry

UN 3264



Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **PRI POŽITÍ:** vypláchnite ústa. **NEVYVOLÁVAJTE** zvracanie. **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):** Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte **NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM** alebo lekára. Zneškodnite obsah/nádobu

Balenie: **1L**

HNOJIVO ES druh E.2.4 Tekutá zmes mikroživín bór (B), meď (Cu), molybdén (Mo), zinok (Zn)

- Stimuluje fotosyntézu a zvyšuje obsah chlorofylu.
- Zlepšuje habitus rastliny, vystužuje listy a výhonky, zlepšuje skladovacie vlastnosti plodiny (stimuluje syntézu mechanického tkaniva).
- Znižuje citlivosť voči tlaku hubových a bakteriálnych ochorení.
- Znižuje účinky nadmerného hnojenia dusíkom.
- Zvyšuje výnos a kvalitu produkcie.
- Minimalizuje citlivosť rastlín na nízke teploty.
- Zmierňuje účinky sucha znížením odparovania vody.

Tabuľka použitia a dávok			Obsah živín [m/m]	
Použitie	Dávkovanie [l/ha]			
PŠENICA, TRITIKALE, JAČMEŇ				
jeseň: od fázy 3 listov do konca jesennej vegetácie	0,8	Bór (B) celkovo	0,30 %	kyselina boritá
jar: do fázy klasenia	0,8	Meď (Cu) celkovo	1,00 %	chlorid medi
REPKA OZIMNÁ				
jeseň: od fázy 4 listov do konca jesennej vegetácie	0,8	Molybdén (Mo) celkovo	0,20 %	molybdenan sodný
jar: po začiatku vegetácie do fázy začiatku kvitnutia	0,8	Zinok (Zn) celkovo	0,60 %	chlorid zinočnatý
KUKURICA				
od fázy 2 listov až do fázy 8 listov	0,8			
CUKROVÁ REPA				
od fázy 4 listov až do zapaženia porastu	0,8			
ZEMIAK				
od vyvinutia 3 listov na hlavnom stonke do pokrytia medziriadkov	0,8			

Používať iba v prípade skutočnej potreby. Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Rozsah použitia

FERTISILINN obsahuje rastlinami prijateľný kremík vo forme kyseliny orthokremičitej, $\text{Si}(\text{OH})_4$ – 2,5 % a živiny: bór B (0,3%), meď Cu (1,0%), molybdén Mo (0,2%), zinok Zn (0,6%).

FERTISILINN ovplyvňuje vývoj a výnos rastlín, stimuluje tvorbu chlorofylu a fotosyntézu a zvyšuje transport asimilátov. Znižuje citlivosť voči infekciám bakteriálnych a hubových chorôb a tiež zmierňuje účinky biotických a abiotických stresov. Stopové prvky dopĺňajú nutričné nedostatky a pozitívne ovplyvňujú fyziologické procesy v rastlinách.

Návod na použitie

FERTISILINN vo forme vodného roztoku sa aplikuje na list. Môže byť použitý v spoločnej aplikácii s inými hnojivami. Pred samotným miešaním je potrebné urobiť test pre určenie možnosti používania viaczložkového roztoku.

Množstvo vody: 200-300 l/ha

Príprava postrekovej kvapaliny: do postrekovača naplneného do 1/2 - 2/3 vodou pridať FERTISILINN pri zapnutom miešaní. Podobným spôsobom pridať ostatné prípravky v súlade s ich návodom na použitie. Postrekovač doplniť na požadovaný objem. Postrekovú kvapalinu použiť ihneď po príprave.

Skladovanie a doprava

Hnojivo skladujte v uzavretých originálnych obaloch pri teplote 0°C až +30°C. Kryštály, ktoré sa objavia počas skladovania sa rozpustia vo vode. Jav kryštalizácie nezhoršuje vlastnosti produktu. Obaly skladovať a prepravovať vo zvislej polohe, uzatvorené. V prípade rozliatia zozbierajte kvapalinu a povrch opláchnite vodou. Zozbieranú kvapalinu použite na hnojenie.

Bezpečnostné opatrenia

Udržujte mimo dosahu detí. Skladovať v suchu v originálnych uzavretých obaloch. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte mu etiketu. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade rozliatia, okamžite zozbierajte zvyšok opláchnite vodou.

Výrobca

PUH Chemirol Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3,
88-300 Mogilno, POLSKO
tel. +48 (52) 318 88 00
www.chemirol.com.pl


Výhradný distribútor

INNVIKO Agrar CZ s.r.o.
Thamova 137/16
186 00 Praha 8
Tel. + 420 226 205 420
www.sk.innviiko.com

Doba použiteľnosti prípravku je 3 roky
od dátumu výroby.
Číslo šarže / dátum výroby: uvedené
na obale.

Balenie:

1L



FERTISILINN

KREMÍK A MIKROŽIVINY

Kvapalnú produkt obsahujúci
kremík a stopové prvky prijateľné
rastlinami

Mo

Si

Cu

B

Zn

Si

inniso
Better chemistry

UN 3264



Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **PRI POŽITÍ:** vypláchnite ústa. **NEVYVOLÁVAJTE** zvracanie. **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):** Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte **NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM** alebo lekára. Zneškodnite obsah/nádobu

Balenie: **1L**