



Postrekový selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže, pšenice jarnej a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Diflufenican 500 g/l

BALENIE

1 l HDPE fľaša

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

KINARA je suspenzný koncentrát, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom v porastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Účinná látka diflufenican blokuje syntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii. Jeho úroveň môže byť znížená na suchých pôdach, v prípade nedostatočného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácii, na pôdach s vysokým obsahom ílu alebo organickej hmoty.

Prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacych semien. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.

Po aplikácii sa môže vyskytnúť prechodné zblednutie obilnín, neovplyvní to však ich následný rast.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI:

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, fialka roľná, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí.

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, drchnička roľná, kapsička pastierska, pohánkovec ovíjavý.



Jesenňou aplikáciou prípravku KINARA výrazne eliminujete výskyt ozimných burín v porastoch obilnín.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Preemergentná aplikácia:

Prípraok KINARA aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe. Pôda by mala byť dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou. Optimálnu účinnosť dosiahnete, keď pripravok aplikujete za vlhkých podmienok, alebo ak po aplikácii mierne zaprší.

Na klíčiach obilnín môže dôjsť k zmene sfarbenia

prvého listu, čo však nemá negatívny vplyv na úrodu. Porast vysievajte do normálnej hĺbky (25 mm) a zabezpečte, aby boli zrná dobre prikryté.

Postemergentná aplikácia:

Prípravok možno aplikovať od 1. listu obilnín najneskôr však do konca odnožovania (BBCH 11-29).

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ako náhradná plodina, v prípade zaorania porastu v dôsledku zlého zidenia alebo poškodenia, môže byť na jeseň vysiatá pšenica ozimná a po orbe jačmeň ozimný; na jar po spracovaní pôdy do hĺbky 15 cm môžu byť vysiate jarné obilniny a ostatné jarné plodiny bez obmedzenia.

Sejba následných jesenných plodín v normálnej

rotácií: po zbere plodiny po dôkladnom spracovaní pôdy môžu byť vysievané ozimné obilniny bez obmedzenia.

Sejba následných jarných plodín v normálnej rotácií: pred sejbou alebo výsadbou jarných plodín je potrebné pôdu dôkladne spracovať do hĺbky 15 cm.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny.

NAŠE ODPORÚČANIE

Naším hlavným odporúčaním pre prípravok KINARA je jeho spoločná aplikácia s prípravkom CEVINO 500 SC (flufenacet) na jeseň v PRE alebo POST emergentnom ošetrovaní. Spoločný tmix vykazuje široké spektrum

účinnosti na trávovité a dvojkličnolistové buriny. V prípade zákazníka, ktorý hľadá lacné ošetrovanie pre kontrolu iba dvojkličnolistových burín je prípravok KINARA ideálnym riešením.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	Dvojkličnolistové buriny	0,25 l	AT	Preemergentne, postemergentne
Pšenica jarná, jačmeň jarný	Dvojkličnolistové buriny	0,25 l		