



OZIMNÉ OBILNINY

SYSTÉM OŠETRENIA - JESEŇ

CEVINO 500 SC

flufenacet 500 g/l

PRE

POST

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) určený na preemergentné a postemergentné ošetrovanie pšenice ozimnej proti jednoročným trávam.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok CEVINO 500 SC obsahuje účinnú látku flufenacet patriacu do chemickej skupiny oxyacetamidov a účinkuje ako inhibítor delenia buniek. Inhibícia mitózy a bunkového delenia vedie k spomaleniu procesov rastu rastlín, ktoré vedú k úhynu rastliny. Flufenacet je prijímaný hlavne koreňovým systémom, hypokotylom a klíčovými výhonkami a je translokovaný prevažne xylémom. Po aplikácii sa rast spomalí v priebehu niekoľkých hodín a viditeľné symptómy sa vyskytnú počas niekoľkých dní.



Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
pšenica ozimná	trávovité buriny	0,24 – 0,3 l	AT	PRE
pšenica ozimná	trávovité buriny	0,24 – 0,35 l	AT	POST

POKYNY PRE APLIKÁCIU

- Na jeseň preemergentne najneskôr do troch dní po výseve (BBCH 00 - 09)
- Na jeseň postemergentne od 1. listu vyvinutého až do začiatku odnožovania (BBCH 11 – 20)

KINARA®

diflufenican 500 g/l

PRE

POST

Postrekový selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže, pšenice jarnej a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojkličnolistovým burinám.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

KINARA® je suspenzný koncentrát, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom v porastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojkličnolistovým burinám. Účinná látka diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii.

Prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacich semien. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.



Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny	0,25 l	AT	PRE/POST

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Preemergentná aplikácia: Prípravok aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe. Pôda by mala byť dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou. Optimálnu účinnosť dosiahnete, keď prípravok aplikujete za vlhkých podmienok, alebo ak po aplikácii mierne poprší.

Postemergentná aplikácia: Prípravok možno aplikovať od 1. listu obilnín najneskôr však do konca odnožovania (BBCH 11-29).

RASSEL 100 SC

florasulam 100 g/l

POST

Selektívny herbicíd so systémovým účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) určený na ošetrovanie pšenice ozimnej a tritikale ozimného proti dvojklíčnolistovým burinám.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok obsahuje účinnú látku florasulam, ktorá patrí do skupiny inhibítorov acetolaktát syntázy (ALS). V rastline dochádza k inhibícii syntézy rozvetvených aminokyselín, čo vedie k poruchám biosyntézy bielkovín. Do rastliny je prijímaný cez listy a rýchlo translokovaný v celej rastline. Krátko po ošetrovaní inhibuje rast a vývoj burín.

Za optimálnych podmienok počasia (vyššia teplota a vlhkosť vzduchu) dochádza k celkovému úhynu burín po 7-10 dňoch. V prípade nízkych teplôt (cca 4 °C) dochádza k celkovej likvidácii citlivých burín približne po 3 týždňoch.



Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny	0,05 l	AT	-

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica ozimná: prípravok aplikujte od rastovej fázy 3 listov do fázy 1. kolienka (BBCH 13-31).

SUPERHERB 20 SG

Metsulfuron-methyl 200 g/kg

POST

Herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale, raži ozimnej a jačmeni jarnom.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok SUPERHERB 20 SG je systémový selektívny herbicíd, prijímaný je listami a koreňmi rastlín a rýchlo translokovaný do celej rastliny. Účinná látka metsulfuron-methyl patrí do skupiny sulfonylmočovín. Pôsobí ako inhibítor ALS (acetolaktátsyntázy) t.j. syntézy esenciálnych aminokyselín (valín a isoleucín), spôsobuje zastavenie delenia buniek a následne zastavenie rastu ošetrovaných rastlín. Herbicídny účinok prípravku je pozorovateľný po 2-4 týždňoch od jeho použitia.



Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30 g	N/A	-

POKYNY PRE APLIKÁCIU


Prípravok aplikujte od začiatku odnožovania, do rastovej fázy, kedy je prvé kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 21-31). Najlepší herbicídny účinok je pri aplikácii prípravku na mladé, intenzívne rastúce buriny.

ODPORÚČANIE PRE APLIKÁCIU PODĽA BURINNÉHO SPEKTRA A TERMÍNU APLIKÁCIE

Dvojkľúčolistové buriny	Metlička obyčajná	Výmrv repky

Prípravok	Dávka na ha	Termín aplikácie	Odporúčaná cena ošetrovania
Kinara			
Cevino 500 SC			
Superherb 20 SG			
Rassel 100 SC			

Technicko poradenský servis



Ing. Jozef Michňa
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

jozef.michna@belbaplus.sk
+421 905 644 103



Ing. Peter Belan
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

peter.belan@belbaplus.sk
+421 905 454 034



Ing. Michaela Baštáková
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

michaela.bastakova@belbaplus.sk
+421 918 735 904



Ing. Jana Jančová
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

jana.jancova@belbaplus.sk
+421 918 642 829



Ing. Ján Kanda
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

jan.kanda@belbaplus.sk
+421 903 584 567