

# DELMETROS 100 SC

DELMETROS 100 SC® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.



**Insekticíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie s vodou (SC), na ošetrovanie repky ozimnej, pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a zemiakov proti živočíšnym škodcom.**

#### ÚČINNÁ LÁTKA:

Deltamethrin 100 g/l

#### BALENIE:

1 l HDPE fľaša

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

Deltamethrin, účinná látka prípravku DELMETROS 100 SC, je svetlo stabilný syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinok, preto je potrebné,

aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín. Nepôsobí na roztoče.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU:

**Dávka vody:** 200 - 400 l/ha

**Počet ošetrení:** max. 1x za vegetačné obdobie.

### Repka ozimná

Prípravok vykazuje dostatočnú účinnosť na škodcov v repke ozimnej.

### Skočka repková, kvetárka kapustová

**Termín aplikácie:** prípravok používajte na jeseň pri výskyte škodcov na mladých rastlinách alebo, keď zistíte prvé poškodenie vo fáze dvoch listov až do fázy vyvinutých piatich listov (BBCH 12-15).



### Blyskáčik repkový

**Termín aplikácie:** používajte podľa signalizácie pri výskyte škodcu na rastlinách od fázy, kedy sú viditeľné samostatné kvetné pupene (hlavné kvetenstvo) ale sú ešte stále uzavreté, až do fázy kedy sú viditeľné prvé petaly, ale kvetné pupene sú ešte stále uzavreté („žltý puk“). (BBCH 55-59).



### Jačmeň jarný

**Termín aplikácie:** prípravok aplikujte na začiatku liahnutia lariet kohútika pestrého, od fázy konca metania, kedy je pošva vlajkového listu zdurená (BBCH 45) do fázy strednej mliečnej zrelosti (BBCH 75).

## Pšenica ozimná

**Termín aplikácie:** prípravok používajte na začiatku liahnutia lariev kohútika pestrého, od konca vývojovej fázy, kedy sú viditeľné prvé oste (len pri ostinatých odrodách) (BBCH 49) až do konca fázy mliečnej zrelosti (BBCH 79).



## Zemiak

**Termín aplikácie:** prípravok používajte v období maximálneho liahnutia lariev, od fázy prvých individuálnych kvetných pupeňov ( $l_1 - 2$  mm), ktoré sú na 1. vrcholíku viditeľné (hlavná byl) (BBCH 51) do fázy plného kvitnutia: 50% kvetov v 1. vrcholíku otvorených (BBCH 65).



## VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:

Po aplikácii prípravku DELMETROS 100 SC nie sú známe negatívne účinky na následné plodiny.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

## NAŠE ODPORÚČANIE:

DELMETROS 100 SC s účinnou látkou deltamethrin je dotykový a požerový insekticíd proti širokému spektru škodcov. Prípravok aplikujte pri výskyte škodcu a prekročení prahu škodlivosti. Prípravok neaplikujte pri teplotách nad

25°C rovnako ako ostatné pyreteroidné prípravky. Pre dosiahnutie plného insekticídneho účinku odporúčame aplikáciu v postrekovej tekutine s rozsahom pH 5,0-6,0. Pre úpravu vody pridajte TRON pH – viac o prípravku na str. 93.

## NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
repka ozimná	skočka repková, kvetárka kapustová, blyskáčik repkový	0,05 l	45 dní	-
penica ozimná	kohútik pestrý	0,05 l	30 dní	-
jačmeň jarný	kohútik pestrý	0,05 l	30 dní	-
zemiak	pásavka zemiaková	0,05 l	7 dní	-