



Postrekový selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže, pšenice jarnej a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Diflufenican 500 g/l

BALENIE:

1 l HDPE fľaša

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

KINARA je suspenzný koncentrát, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom v porastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Účinná látka diflufenican blokuje syntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii. Jeho úroveň môže byť znížená na suchých pôdach, v prípade nedostatočného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácii, na pôdach s vysokým obsahom ílu alebo organickej hmoty.

Prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacych semien. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.

Po aplikácii sa môže vyskytnúť prechodné zblednutie obilnín, neovplyvní to však ich následný rast.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI:

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, fialka roľná, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí.

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, drchnička roľná, kapsička pastierska, pohánkovec ovjávý.



Jesenňou aplikáciou prípravku KINARA výrazne eliminujete výskyt ozimných burín v porastoch obilnín.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Preemergentná aplikácia:

Prípraok KINARA aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe. Pôda by mala byť dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou. Optimálnu účinnosť dosiahnete, keď pripravok aplikujete za vlhkých podmienok, alebo ak po aplikácii mierne zaprší.

Na klíčiach obilnín môže dôjsť k zmene sfarbenia

prvého listu, čo však nemá negatívny vplyv na úrodu. Porast vysievajte do normálnej hĺbky (25 mm) a zabezpečte, aby boli zrná dobre prikryté.

Postemergentná aplikácia:

Prípravok možno aplikovať od 1. listu obilnín najneskôr však do konca odnožovania (BBCH 11-29).

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY :

Ako náhradná plodina, v prípade zaorania porastu v dôsledku zlého zídienia alebo poškodenia, môže byť na jeseň vysiatá pšenica ozimná a po orbe jačmeň ozimný; na jar po spracovaní pôdy do hĺbky 15 cm môžu byť vysiate jarné obilniny a ostatné jarné plodiny bez obmedzenia.

Sejba následných jesenných plodín v normálnej

rotácii: po zbere plodiny po dôkladnom spracovaní pôdy môžu byť vysievane ozimné obilniny bez obmedzenia.

Sejba následných jarných plodín v normálnej rotácii: pred sejbou alebo výsadbou jarných plodín je potrebné pôdu dôkladne spracovať do hĺbky 15 cm.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny.

NAŠE ODPORÚČANIE:

Naším hlavným odporúčaním pre prípravok KINARA je jeho spoločná aplikácia s prípravkom CEVINO 500 SC (flufenacet) na jeseň v PRE alebo POST emergentnom ošetrení. Spoločný tmix vykazuje široké spektrum účinnosti

na trávovité a dvojkličnolistové buriny. V prípade zákazníka, ktorý hľadá lacné ošetrenie pre kontrolu iba dvojkličnolistových burín je prípravok KINARA ideálnym riešením.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritíkale	dvojkličnolistové buriny	0,25 l	AT	preemergentne, postemergentne
pšenica jarná, jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny	0,25 l	AT	preemergentne, postemergentne

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.