

KOREKT 510 SL

KOREKT 510 SL® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.



Regulátor rastu vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený proti poliehaniu pšenice ozimnej, tritikale a jačmeňa jarného.

ÚČINNÁ LÁTKA:
ethephon 510 g/l

BALENIE:
5 l HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU :

Účinná látka ethephon preniká do rastlinných pletív kde dochádza k uvoľňovaniu etylénu, ktorý spoločne s inými hormónmi spôsobuje skracovanie stoniek a stimuluje syntézu spevňujúcich látok ako lignín a celulóza, čím zvyšuje odolnosť obilnín voči poliehaniu.

Použitie prípravku uľahčuje mechanický zber. Zabraňuje vzniku strát súvisiacich so slabým vývinom a rastom zrn.

Intenzita pôsobenia prípravku závisí od termínu aplikácie postreku, rastovej fázy pestovanej rastliny, kompaktnosti lánov, stanovišťa a od poveternostných podmienok.

Prípravok je určený na aplikáciu plošnými samohybnými alebo ťahanými postrekovačmi.

POKYNY PRE APLIKÁCIU :

Pšenica ozimná

Prípravok Korekt 510 SL je možné aplikovať v pšenici ozimnej od rastovej fázy 1. kolienka (BBCH 31) až do fázy, kedy je pošva zástavnicového listu otvorená (BBCH 31-47). Na termín aplikácie a dávku vplyvajú najmä rastová fáza, priebeh počasia, aktuálna teplota, prípadný tmix partner a pod. Pre skoršie rastové fázy odporúčame aplikáciu prípravku Korekt 510 SL s partnerom, ktorý predlžuje účinnosť morforegulácie. Vhodnou kombináciou je Korekt 510 SL 0,3-0,4 l/ha + Florone 0,4 l/ha, poprípade kombinácia s prípravkami s obsahom účinnej látky CCC - Retabella 750 SL v dávke 0,3-0,5 l/ha. V neskorších rastových fázach s ohľadom na stav porastu, intenzitu hnojenia aplikujte prípravok Korekt 510 SL samostatne v dávkach 0,75-1,0 l/ha.

Jačmeň jarný

Prípravok Korekt 510 SL sa aplikuje od rastovej fázy 1. kolienka až do fázy, kedy je pošva zástavnicového

listu otvorená (BBCH 31-47). Z nášho pohľadu pre porasty jarného jačmeňa je vhodná delená aplikácia morforegulátorov, kde do prvej fázy (BBCH 31 - 32) odporúčame aplikáciu prípravkov Korekt 510 SL 0,3 - 0,5 l/ha a Florone 0,3 l/ha (poprípade v tmixe s trinexapack 0,2 l) s následnou sólo aplikáciou prípravku Korekt 510 SL v dávke 0,3 - 0,7 l/ha vo fáze BBCH 45-47.

Silný dážď do 4-5 hodín po ošetrení môže znížiť účinok prípravku.

Herbicídy zo skupiny fenoxykyselín určené na likvidáciu dvojklíčnolistových burín aplikujte pred prípravkom KOREKT 510 SL, a to v dávkach a termínoch uvedených na ich na etiketách.

Prípravok KOREKT 510 SL neaplikujte na mokré rastliny, na oslabené rastliny a rastliny poškodené mrazom, suchom, zamokrením, škodcami, chorobami a na rastliny s prejavmi nedostatku výživných látok. Prípravok taktiež neaplikujte pri teplotách nižších ako 10 °C a na výrazne zaburinených

plochách, ak neboli použité prostriedky proti burinám, pretože skrátenie stebiel môže vytvoriť dobré podmienky pre

rozvoj burín. Pri aplikácii zabráňte prekryvaniu postrekových pásov (vrátane úvratí).

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:

Prípravok nie je nebezpečný pre následné plodiny pri štandardnom striedaní plodín. Aplikáciou prípravku nesmú

byť zasiahnuté susediace porasty.

NAŠE ODPORÚČANIE:

Prípravok KOREKT 510 SL (etephon) je jediný regulátor rastu, ktorým dokážeme modelovať porast. Etephon spomaľuje produkciu a transport auxínov čím spomaľuje vývoj hlavného stebľa a urýchľuje vývoj bočných odnoží. Viditeľným efektom účinku etephonu je miena lignifikácia pletív čo má za následok vystuženie a mechanické spevnenie stebľa. Rastliny zväčšujú hrúbku stien buniek a zastavujú predlžovanie internódií. Etephon pôsobí silne a presne

na tie miesta kde sa aplikoval bez zaťaženia metabolizmu rastlín. Výhodou je rýchly, silný ale hlavne účinné zastavenie rastu stebiel v čase najintenzívnejšieho rastu. Etephon spoľahlivo funguje i za zamračeného počasia čo dáva istotu účinku. Aplikácia sa vykonáva od BBCH 31. z pokusov i z polí sa javí ideálne aplikácia spoločne s trinexapack ethylom TREGUS 500 EC v zníženej dávke.



Posledný možný termín aplikácie
Korekt 510 SL v jačmeni jarnom

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,7-0,9 l	AT	-
tritikale	proti poliehaniu	0,75-0,95 l	AT	-
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,7 l	AT	-

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.