

# MAJOR 300 SL®

MAJOR 300 SL® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.



MAJOR 300 SL je herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), ktorý je určený na ošetrovanie repky ozimnej proti dvojklíčnolistovým burinám.

**ÚČINNÁ LÁTKA:**  
Clopyralid 300 g/l

**BALENIE:**  
5 l HDPE kanister

## PÔSOBNIE PRÍPRAVKU:

MAJOR 300 SL je systémový postemergentný herbicíd, prijímaný listami burín. Spôsobuje blokádu auxínov, t. j. rastlinných hormónov, ktoré regulujú rast rastlín, v dôsledku

čoho dochádza k pozastaveniu syntézy aminokyselín. Prípravok navyše narušuje bunkové dýchanie.

## SPEKTRUM ÚČINNOSTI:

**Citlivé buriny:** pichliač roľný, ruman roľný, nevädza poľná, parmanček nevoňavý

**Odolné buriny:** fialka roľná, metlička obyčajná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, mak vlčí, hviezdica prostredná, veronika jarná

## POKYNY PRE APLIKÁCIU:

**Dávka vody:** 200 – 300 l/ha.

**Počet ošetrení:** max. 1x za vegetačné obdobie.

Prípravok aplikujte do repky ozimnej na jar od rastovej fázy bez bočných výhonov až do objavenia 1. bočného výhonu (BBCH 33-50) a v rastovej fáze 2 – 4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12 - 14), kedy sú buriny intenzívne rastúce a najcitlivejšie.

Prípravok neaplikujte na mokré rastliny ani na rastliny poškodené chorobami a škodcami, v zmesi s hnojivami. Prípravok aplikujte pozemným postrekom schválenými postrekovačmi a kvapkami strednej veľkosti. Postrekujte len za bezveterného počasia. Zabráňte prekryvaniu postrekových pásov (vrátane úvratí).

**Odporúčaná teplota pri aplikácii prípravku je 10 – 12°C. Nepoužívajte prípravok pri teplote vyššej ako 25 °C.**

## VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY :

Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia v pôde rozloží (mikrobiálny rozklad) bez rizika pre následné plodiny. V prípade, že je potrebné po aplikácii prípravku ošetrovať plodiny zaorať, je možné ako náhradné plodiny pestovať obilniny, repu cukrovú a plodiny, na ktoré sú prípravky s účinnou látkou clopyralid autorizované. V prípade náhradných plodín nesiať strukoviny a plodiny z čeľade solanaceae (zemiaky, rajčiak atď.)

V tom istom roku je možné ako následné plodiny pestovať obilniny, repu cukrovú a plodiny, na ktoré sú prípravky s účinnou látkou clopyralid autorizované.

**Postrekovou kvapalinou alebo úletom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!** Mimoriadne citlivé sú lucerna, ďatelina, ovocné sady, vinič a chmeľ. V blízkosti týchto plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty).

## NAŠE ODPORÚČANIE:

V prípade výskytu burín v porastoch repky ozimnej, ktoré v neskorších fázach výškovo prerastajú samotnú repku, je MAJOR 300 SL vhodným riešením na ich elimináciu.

Aplikácia vyžaduje vyššiu teplotu kedy buriny už dostatočne vegetujú. Prípravok MAJOR 300 SL spoľahlivo kontroluje i ťažko ničiteľné buriny ako pichliač roľný, ruman a iné.



## NÁVOD NA POUŽITIE:

| Plodina      | Účel použitia            | Dávka/ha | Ochranná doba | Poznámka |
|--------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| repka ozimná | dvojkľúčnolistové buriny | 0,4 l    | AT            | -        |

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.