



MOLLIS 450 SC

JEDINEČNÉ FUNGICÍDNE RIEŠENIE
S TROJNÁSObNOU SILOU PRE
JARNÝ JAČMEŇ

MOLLIS 450 SC

NOVÉ
V PONUKE

Trojitý fungicídny zásah proti hubovým chorobám jarného jačmeňa

MOLLIS 450 SC

AZOXYSTROBIN 200 g/l

- účinná látka zo skupiny strobilurínov
- vynikajúci preventívny účinok
- dlhodobá ochrana porastu proti chorobám
- pozitívny vplyv na výšku a kvalitu úrody
- podpora energetického systému rastliny

DIFENOKONAZOL 125 g/l

- účinná látka zo skupiny triazolov
- preventívny a kuratívny účinok
- akropetálny a translaminárny pohyb v rastline
- silný systémový účinok
- ochrana nových prírastkov


TEBUKONAZOL 125 g/l

- účinná látka zo skupiny triazolov
- systémový účinok s rýchlym príjmom a pohybom v rastline
- preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
- prevažne akropetálny pohyb v rastline
- široké spektrum patogénov

ÚČINNOSŤ PRÍPRAVKU



Kontrola



MOLLIS 450 SC 1l/ha
(BBCH 37-38) Stav 9 týžňov po aplikácii.

ZDROJ: A. BRACHACZEK, INNIGO PL, malo-parcelové pokusy pôdina: pšenica ozimá, lokalita: Veľkopolské Vojvodstvo

VÝHODY APLIKÁCIE

- vysoká koncentrácia účinných látok v produkte
- kombinácia 3 účinných látok s rôznym mechanizmom účinku
- vyvážený pomer jednotlivých účinných látok
- dlhodobá preventívna účinnosť proti širokému spektru chorôb
- pozitívny vplyv na výšku a kvalitu úrody

POZNÁMKY K APLIKÁCIÍ

Aplikáciu vykonávajúte pri objavení sa prvých príznakov chorôb alebo preventívne.

JEDNA APLIKÁCIA:

MOLLIS 450 SC 0,9 - 1,0 l/ha

od fázy 2. kolienka po fázu plného kvitnutia (**BBCH 32 - 51**).

DVE APLIKÁCIE:

MOLLIS 450 SC 0,9 - 1,0 l/ha + BUKAT 500 SC 0,5 l/ha

1. aplikácia od fázy 2. kolienka po fázu vlajkového listu (**BBCH 30 - 37**).

2. aplikácia od fázy, keď je 20 % klasu vyrasteného, až po štádium plného kvitnutia (**BBCH 50 - 59**).

Použite výrobok pri teplote vzduchu nad 12 °C.

systém jedného fungicídneho ošetrenia

MOLLIS 450 SC

systém dvoch fungicídnych ošetrení

MOLLIS 450 SC

BUKAT 500 SC

