

AKTUÁLNE ODPORÚČANIA PRE REPKU OZIMNÚ


Vhodné riešenia z nášho portfólia:

Vzhľadom na priebeh počasia v zime a súčasnom období je dôležité zamerať sa na celkový štart a rozvoj koreňovej sústavy u všetkých typov porastov repky ozimnej.



Nevyrovnané a poškodené porasty repky

Je potrebné voliť ošetrenia, ktoré pozitívne ovplyvňujú regeneráciu, štart a rast koreňovej sústavy. Mohutnosť koreňovej sústavy vnímame ako dôležitý faktor v súčasnom období vzhľadom na deficit zrážok a celkového nedostatku vlahy zo zimného obdobia.



Základom ošetrenia je prípravok **RAYKAT START** v dávke 0,5 l/ha, ktorý okrem celkovej regenerácie a jarného štartu pozitívne vplýva i na vetvenie. Toto ošetrenie je vhodné doplniť vyššou hladinou fosforečného hnojiva v našom prípade **FITOBELLA N-P-Mg (4-35-10)** v dávke 1,5-2,0 l/ha alebo **OPTI REPKA** v dávke 3,0 – 4,0 kg/ha. Obe hnojivá sa vyznačujú vyšším obsahom fosforu ale i horčíka, ktorý zvyšuje fotosyntetickú aktivitu rastlín. Dodanie síry prípravkom **THIOFIX SULF** v dávke 2,0-5,0 l/ha, rovnako patrí medzi základné jarné ošetrenia repky.

kondície

Doplnenie bóru (B) prípravkom **CROPVIT B** v dávke 1,0 l/ha alebo pre kyslé pôdy **CROPVIT BMo** v dávke 1,0 l/ha. Jednorazová dávka bóru by nemala presahovať 150 g/ha, je lepšie celkovú dávku bóru rozdeliť na viac aplikácií.

NAŠE ODPORÚČANIA:

RAYKAT START	FITOBELLA N-P-Mg OPTI REPKA	AMINOCAT 30	THIOFIX SULF	CROPVIT B CROPVIT Bmo BOROHUMINE 100
---------------------	--	--------------------	---------------------	---



Kompletné vyrovnané porasty

Pre tento typ porastov je dôležité naštartovanie koreňovej sústavy vyššími dávkami fosforu. Volíme preto kombináciu prípravku **REOX 7-21-0 M** s hnojivami s obsahom fosforu **FITOBELLA N-P-Mg** a **OPTI REPKA**.

Doplnenie bóru (B) prípravkom **CROPVIT B** v dávke 1,0 l/ha alebo pre kyslé pôdy **CROPVIT BMo** v dávke 1,0 l/ha. Jednorazová dávka bóru by nemala presahovať 150 g/ha, je lepšie celkovú dávku bóru rozdeliť na viac aplikácií.



NAŠE ODPORÚČANIA:

REOX 7-21-0 M	FITOBELLA N-P-Mg OPTI REPKA	CROPVIT B CROPVIT Bmo BOROHUMINE 100
---------------	--------------------------------	--



Insekticídna ochrana

Znížením počtu typov insekticídnych účinných látok je dôležité správne načasovanie insekticídneho zásahu na základe monitorovania náletu. Pre prvé insekticídne zásahy nám zostali pyretroidné prípravky [DELMETROS 100 SC](#) a [SWEEP](#), ktoré je možné vhodne doplniť prípravkami ako [APIS 200 SE](#) s účinnou látkou acetamidrid vtedy, keď priemerná teplota dosahuje 12°C.

NAŠE ODPORÚČANIA:

APIS 200 SE Acetamidrid 0,15 l/ha	DELMETROS Deltamethrin 0,05 l/ha SWEEP Cypermethrin 0,05 l/ha
---	--



Vyššia účinnosť DAMu

V súčasnom období by sa pozornosť mala sústrediť na zvýšenie využiteľnosti dusíka dodávaného hnojivami typu DAM. Prípravok [UREAFIN NBPT](#) zvyšuje využiteľnosť dusíka z hnojiva o **15-20%** zabraňuje aktivite enzýmu ureáza a tým spomaľuje rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu. Odporúčané dávkovanie je 0,9 – 1,3 l/m³ DAMu.



Následná podpora vetvenia

Po regenerácii nevyrovnaných a poškodených porastov odporúčame na základe skúseností aplikáciu prípravku [FLORONE](#) s obsahom NPK, mikroelementov, org. hmoty cytokynínov v dávke 0,4 l/ha v čase kedy porast dosahuje výšku do 20cm na podporu rozkonárovania repky.