

Vhodné riešenia z nášho portfólia:

Na viacerých územiach Slovenska, nás v priebehu mesiaca máj potešili zrážky a to je pozitívna správa pre pestovateľov. Pri pestovaní jarného jačmeňa treba zabezpečiť optimálne podmienky pre rast a vývoj a rovnako dostatočnú úroveň fungicídnej ochrany, pre zvýšenie kvality úrody.



Fungicídna ochrana – MOLLIS 450 SC

Pre túto sezónu, vám v rámci fungicídnej ochrany jednoznačne odporúčame použitie prípravku **MOLLIS 450 SC**, našu novinku v portfóliu. Vyznačuje sa trojnásobnou silou v boji proti hubovým chorobám jačmeňa jarného.

Prečo MOLLIS 450 SC?

- vysoká koncentrácia účinných látok v produkte
- kombinácia 3 účinných látok s rôznym mechanizmom účinku
- vyvážený pomer jednotlivých účinných látok
- dlhodobá účinnosť proti širokému spektru chorôb
- preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
- pozitívny vplyv na kvalitu úrody

Prípravok obsahuje 3 účinné látky:

- AZOXYSTROBIN 200 g/l
- DIFENOKONAZOL 125 g/l
- TEBUKONAZOL 125 g/l



Aplikáciu vykonávajúte pri objavení sa prvých príznakov chorôb alebo preventívne. Aplikáciu je možné rozdeliť:

V prípade 1 fungicídneho ošetrenia počas vegetácie, odporúčame použiť MOLLIS 450 SC v dávke 0,9-1,0l od fázy 2. kolienka po fázu plného kvitnutia (BBCH 32 - 51).

V prípade 2 fungicídnych ošetrení počas vegetácie: 1. aplikácia od fázy 2. kolienka po fázu vlajkového listu (BBCH 32 - 37) a 2. aplikácia od začiatku klasenia až po štádium plného kvitnutia (BBCH 52 - 65).



Insekticídna ochrana - SWEEP

V prípade výskytu kohútika alebo vošiek, odporúčame širokospektrálne insekticídne ošetrenie **SWEEP**, s účinnou látkou *cypermethrin* 500 g/l. **SWEEP** patrí do skupiny pyretroidov s kontaktným účinkom. Aplikácia sa vykonáva pri výskyte škodcov a prekročení prahu škodlivosti.



Listová výživa

Jarný jačmeň je plodina relatívne citlivá na príjem živín z pôdy, preto treba zabezpečiť ich dostatok pre správny rast a vývoj. Efektívnym spôsobom je listová aplikácia prípravku **FITOBELLA N-Cu-S**, ktorý okrem dusíka obsahuje meď, dôležitú súčasť procesu tvorby a stabilite chlorofylu v dávke 0,5 l/ha. Ako alternatívu pre spevnenie stebľa odporúčame prípravok **FLORONE** v dávke 0,4 l/ha.

Na zvýšenie efektívnosti listových hnojív, odporúčame každú aplikáciu doplniť prípravkom **AMINOCAT 30**, s obsahom NPK a voľných aminokyselín. Rastliny ľahšie prekonávajú stres, ako sú obdobia sucha a zlepšuje sa absorpcia