

ES HNOJIVO

CUPRUM 600 WG

VYSOKO KONCENTROVANÉ SUSPENZNÉ HNOJIVO OBSAHUJÚCE OXYCHLORID MEĎNATÝ (600 G/L)

ÚČINNÁ KOREKCIA NEDOSTATKOV MEDI V RASTLINÁCH

CUPRUM 600 WG je suspenzné hnojivo používané vo vodnom roztoku určené na listovú aplikáciu. Odporúča sa najmä pre rastliny s vysokým dopytom po medi. Zabraňuje výskytu nepriaznivých zmien v plodinách spôsobených nedostatkom medi.

ES HNOJIVO E.1.3h typ

Suspenzné hnojivo oxychloridu meďnatého.

Kompozícia

Absolútna meď 24 000

DÁVKOVANIE A ČAS APLIKÁCIE

Plodina	Dávkovanie		Čas aplikácie
	l/h	l vody	
Jablone a hrušky	1-1,25	500-750	Po začatí vegetácie do štádia zeleného púčika
	1,5	500-750	1-2 ošetrenia Po zbere ovocia
Čerešne	2-2,75	500-750	Po začiatku jarnej vegetácie
	1,0	500-750	Vo fáze kvitnutia
	2,5	500-750	Po zbere ovocia
Slivky	1,5	500-750	Ošetrovanie vykonajte v štádiu opuchu púčikov
	1,5-2,0	500-750	Po zbere plodov a vo fáze opadu listov
Broskyne	3,5-4,0	500-700	Skoro na jar, tesne pred začiatkom vegetácie alebo na jeseň po zbere
Jahoda	0,5-1,0	400-600	Od štádia 3 až 4 dobre vyvinutých listov až po vyfarbenie prvých plodov (okrem štádia kvitnutia)
Čučoriedka	0,5	400-600	Od štádia prasknutia púčikov až do štádia pred kvitnutím a po zbere ovocia
Zemiaky	1,75-2,25	200-400	Prvé ošetrovanie po úplnom vzídení, ďalšia aplikácia o 14 dní neskôr . Neaplikujte v štádiu kvitnutia
Obilniny	0,5	200-300	Na jeseň a/alebo na jar, od začiatku až do konca odnožovania
Paradajka Paprika	1,5-1,75	500	2 týždne po výsadbe sadeníc, potom 1-3 aplikácie s odstupom 14 dní
Uhorka	1,5-2	500	Po vytvorení 6 listov , potom 1-3 aplikácie s odstupom 14 dní
Ostatné plodiny	0,5	500	V štádiu intenzívneho rastu a zvýšeného dopytu
Hľúboviný zelenina	1,0	500-700	Až 2 aplikácie v štádiu nastavenia hlavy
Cukrová repa	1,0 – 1,5	200-400	Prvé ošetrovanie po prekryvaní medziriadkov, ďalšia aplikácia po 14-21 dňoch

POZOR

Obsahuje: trihydroxid dikopperchloridu (II)

H302+H332 Škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

H410 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

P261 Zabráňte vdychovaniu spreja

P264 Po manipulácii dôkladne umyte

P270: Pri používaní tohto produktu nejedzte, nepite ani nefajčite.

P301+P312: PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P501: Zlikvidujte obsah/kontajner na schválenú miestnu likvidáciu odpadu v súlade s miestnymi/národnými predpismi.

UFI: Y300-FOCE-H00S-GFJX

Používa sa len tam, kde existuje uznaná potreba.

Neprekračujte odporúčanú dávku.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIEDZIOWY 600 SC sa používa v termínoch a dávkach odporúčaných v programoch hnojenia pre jednotlivé plodiny alebo v prípade diagnostikovaného nedostatku medi v rastlinách.

Pred použitím pretrepte.

Určené na aplikáciu listov vo forme vodného roztoku. Môže sa použiť v kombinácii s inými agrochemikáliami po vykonaní testu potvrdzujúceho miešateľnosť.

Koncentrácia roztoku a množstvo rozprašovacej kvapaliny by sa mali prispôbiť potrebám jednotlivých plodín a použitej technike postrekovania. Počas striekania sa vyhýbajte vysokej úrovni slnečného žiarenia a teploty, ako aj silnému vetru, ktorý spôsobuje unášanie kvapiek.

Aplikujte hnojivo pomocou poľného alebo ovocného postrekovača so stredne veľkými kvapkami. Mal by sa aplikovať rovnomerne na celé pole.

PRÍPRAVA PRACOVNÉHO ROZTOKU

Pred vytvorením pracovného roztoku určite jeho presné množstvo. Namerané množstvo hnojiva nalejte do nádrže postrekovača čiastočne naplnenej vodou (so zapnutým miešadlom) a potom naplňte vodou na požadovaný objem. Striekajte so zapnutým miešadlom. Prázdny obal trikrát opláchnite vodou, výplachy nalejte do nádrže na pracovný roztok. Po ukončení práce striekacie zariadenie dôkladne vyčistite.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte pri teplote od 0 do 30 stupňov Celzia. Hermeticky uzavreté obaly skladujte a prepravujte vo zvislej polohe.

OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na suchom mieste v pôvodnom a uzavretom obale. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu.

V prípade kontaktu s očami okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade rozliatia alebo úniku okamžite zhromaždite rozliate hnojivo, zvyšky opláchnite vodou.

VÝROBCA

PUH "CHEMIROL" sp. z o.o.

Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

telefónne číslo: +48 52 318 88 79

Doba platnosti:

3 roky od dátumu výroby

Dátum výroby/číslo šarže:

na obale