

CE

# CUPRUM 600 SC

JEDNOZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM  
MIKROŽIVINY VO FORME SUSPENZIE

Dopĺňa nedostatok medi v rastlinách

PRODUKT URČENÝ LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

# 5 L

## NEBEZPEČENSTVO

- H301** Toxický po požití.
- H332** Škodlivý pri vdýchnutí.
- H400** Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.
- H410** Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P264** Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
- P270** Pri používaní tohto produktu nejedzte, nepite ani nefajčite.
- P301+P310** PO POUŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára
- P330** Vypláchnite ústa.
- P405** Uchovávajte uzamknuté.
- P261** Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/výparov/aerosólov.
- P271** Používajte len vonku alebo v dobre vetranom priestore.
- P501** Zneškodnite obsah/nádobu do určených nádob.

UFI: Y300-F0CE-H00S-GFJX



## NÁVOD NA POUŽITIE HNOJIVA

Plodina	Dávkovanie		Termín aplikácie
	I/ha	L vody	
Jablone, hrušky	1-1,25	500-750	Po začatí vegetácie až do fázy zeleného púčika sa odporúčajú 1-2 ošetrenia
	1,5	500-750	Po zbere ovocia
Višne, čerešne	2-2,75	500-750	Po začiatku jarnej vegetácie
	1,0	500-750	Počas obdobia kvitnutia
	2,5	500-750	Po zbere ovocia
Slivky	1,5	500-750	Ošetrenie vykonajte počas obdobia napučňavania púčikov
	1,5-2,0	500-750	Po zbere ovocia a pri opadaní listov
Broskyne	3,5-4,0	500-700	Veľmi skoro na jar tesne pred začiatkom vegetácie alebo na jeseň po zbere
Jahoda	0,5-1,0	400-600	Od štádia 3-4 vyvinutých listov do štádia prvého vyfarbenia plodov (mimo obdobia kvitnutia)
Čučoriedka chocholikatá	0,5	400-600	Od puknutia púčikov až do obdobia pred kvitnutím a po zbere
Zemiaky	1,75-2,25	200-400	Po vytvorení návyku na rastliny, ďalší o 14 dní neskôr
Obilniny	0,5	200-300	Na začiatku odnožovania
Paradajka, paprika	1,5-1,75	500	2 týždne po vysadení sadenic, potom 1-3 ošetrenia v intervaloch 14 dní
Uhorka	1,5-2	500	Po vytvorení 6 listov potom 1-3 ošetrenia v intervaloch 14 dní
Ostatné plodiny	0,5	500	V období intenzívneho rastu a zvýšeného dopytu
Hľúbová zelenina	1,0	500-700	Maximálne 2 ošetrenia počas tvorby hlávky kapusty
Repa cukrová	1,0-1,5	200-400	Prvé ošetrenie po uzavretí riadkov, potom každých 14-21 dní

Pre konkrétne odporúčania kontaktujte spoločnosť BELBA PLUS alebo svojho distribútora zo spoločnosti BELBA PLUS.

Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie.

Zloženie	[% m/m]	[g/l]
Meď (Cu) vo forme oxochloridu úplne rozpustného vo vode	24,0	350,0

### PFC 1(C)(II)(a): JEDNOZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHO M MIKROŽIVINY

#### HNOJIVO S OBSAHO M MIKROŽIVINY VO FORME SUSPENZIE, 24% Cu

Zložky: oxochlorid mednatý (CAS: 1332-65-6)<sup>1</sup>, kde <sup>1</sup>CMC 1: Pôvodné látky a zmesi

**CUPRUM 600 SC** je listové hnojivo s tekutým zložením, určené na podporu výživy a dokrmovania rastlín počas celého vegetačného obdobia. Použitie hnojiva vo vegetačnom období urýchľuje rast rastlín, zvyšuje úrodu a zlepšuje kvalitatívne parametre úrody. Intervenčným použitím hnojiva efektívne a rýchlym tempom odstraňujeme nedostatky medi.

**CUPRUM 600 SC** by sa mal používať v termínoch a dávkach odporúčaných v programoch hnojenia pre jednotlivé druhy rastlín alebo ako intervencia v prípade diagnostikovania nedostatku medi v rastlinách. Pred použitím pretrepte.

Naneste na listy vo forme vodného roztoku. Hnojivo je možné použiť spolu s inými agrochemikáliami po skúške, ktorá umožní možnosť zmiešania.

Konzentráciu roztoku a množstvo postrekovej kvapaliny je potrebné prispôbiť požiadavkám jednotlivých druhov rastlín a technike postreku. Počas ošetrovania sa vyhýbajte silnému snečnému žiareniu, vysokej teplote a vetru, ktoré spôsobujú odtekanie kvapiek.

Hnojivo aplikujte poľnými a sadovými postrekovačmi vo forme strednokvapkových postrekov. Hnojivo aplikujte rovnomerne po celej ploche poľa.

#### PRÍPRAVA PRACOVNEJ KVAPALINY

Pred prípravou pracovnej kvapaliny určite presné potrebné množstvo. Odmierané množstvo hnojiva nasypete do nádrže postrekovača čiastočne naplnenej vodou (pri zapnutom miešadle) a doplňte vodou na požadované množstvo. Striekajte so zapnutým miešadlom. Prázdny obal trikrát opláchnite vodou a výplachy nalejte do nádrže na pracovný roztok. Po použití náradie dôkladne umyte.

#### ODPORÚČANÉ PODMIENKY SKLADOVANIA

Hnojivo skladujte v pôvodnom obale. Skladujte a prepravujte pri teplotách od +5°C do +30°C.

#### PRODUKT URČENÝ LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

**Distribútor:** BELBA PLUS, s.r.o.

Palánok 4605/5, 949 01 Nitra

telefón: +421 905 454 034, email: info@belbaplus.sk

**Výrobca:** PUH „CHEMIROL“ sp. z o.o.

sv. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

tel. +48 52 318 88 79, ndo@chemirol.com.pl

**Dátum spotreby:** 2 roky od dátumu výroby

**Dátum výroby/číslo šarže:** na obale

**Forma:** suspenzia