

# HENIK EXTRA 040 OD



**Herbicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme suspenzného koncentráту na báze oleja (OD) na ničenie dvojkličnolistových burín a ježatky kurej v kukurici.**

**ÚČINNÁ LÁTKA:**  
nicosulfuron 40 g/l

**BALENIE:**  
5 l HDPE kanister

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

Prípravok je neselektívny herbicíd so systémovým účinkom, prijímaný hlavne listmi, rýchle sa v rastline premiestňuje a brzdí ich rast a vývoj. Rast burín je zbrzdený krátko po aplikácii prípravku, kedy dochádza k postupnému odfarbovaniu rastlín. Buriny odumierajú po 20 - 25 dňoch

od ošetrenia. Prípravok účinkuje najefektívnejšie na mladé, intenzívne rastúce buriny vo fáze 2-4 listov (dvojkličnolistové buriny) alebo od fázy 3 listov do konca fázy odnožovania (jednokličnolistové buriny). Teplé a vlhké počasie urýchľuje účinkovanie prípravku, suché počasie môže spomaliť účinok.

## SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

**Citlivé buriny:** hviezdica prostredná, kapsička pastierska  
**Stredne citlivé buriny:** ježatka kuria, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný

**Odolné buriny:** fialka poľná, mrlík biely, pohánkovec ovjávajú

## POKYNY PRE APLIKÁCIU:

**Dávka vody:** 200 - 300 l/ha.

**Počet ošetrení:** max. 1x za vegetačné obdobie.

Prípravok aplikujte po vyklíčení kukurice od fázy 2. do konca fázy 7. pravého listu (BBCH 12- 17). Aplikujte na mladé, intenzívne rastúce buriny vo fáze 2 - 4 listov (dvojkličnolistové buriny) alebo od fázy 3 listov do konca fázy odnožovania (jednokličnolistové buriny).

Prípravok je určený k aplikácii pomocou samohybných alebo traktorových poľných postrekovačov.

Odporúčaný spôsob postreku: stredne veľké kvapky.



Ošetrenie porastov kukurice prípravkami  
HENIK EXTRA OD,  
BARRACUDA a OCEAL

### Prípravok neaplikujte:

- do kukurice cukrovej, kukurice pukancovej a pri produkcii pestovateľských materiálov,
- bezprostredne po období dlhodobého chladu v plodinách, ktorých rast bol zabrzdený následkom nízkych teplôt; ošetrovanie môžete vykonať po tom, čo sa rast obnoví

- v intenzívnom raste kukurice,
- pri teplote vzduchu pod 10 ° C a nad 25 ° C,
- na rastliny oslabené a poškodené mrazom, suchom, škodcami alebo chorobami,
- na mokré rastliny (rosa, dážď).

## VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:

V prípade, že je potrebné predčasne zlikvidovať pole ošetrované prípravkom (následkom poškodenia rastlín mrazom, chorobami alebo škodcami), je možné 30 dní po vykonaní predsejbovej úpravy opäť pestovať kukuricu alebo:

- obilniny – po 3 mesiacoch – na kyslých pôdach; po 9

mesiacoch – na neutrálnych a zásaditých pôdach,

- strukoviny – po 9 mesiacoch,
- lucernu – po 12 mesiacoch.

Na jar nasledujúceho roku je možné pestovať všetky plodiny.

## NAŠE ODPORÚČANIE:

Účinnú látku nicosulfuron je špecialistom na trávovité buriny. Tvorí základ herbicídnej ochrany kukurice pri ePOST a POST emergentných ošetrovaniach. Základným ošetrovaním pre oba termíny je spojenie prípravku STARSHIP (mesotrione) a HENIK EXTRA 040 OD (nicosulfuron). Kombinácia pokrýva široké spektrum dvojkľúčolistových burín a jednoročných tráv ako napr. ježatka kuria noha. Pri výskyte ťažko ničiteľných burín odporúčame pridať prípravok OCEAL (dicamba).

V prípade aplikácie PRE emergentných herbicídov a výskytu

druhej vlny zaburinenia trávovitými burinami je prípravok HENIK EXTRA 040 OD vynikajúcim hasičom.

OD formulácia prípravku zvyšuje penetráciu účinných látok do burín takže nie je potrebné pridávať doplnujúce zmáčadlá.



Ošetrovanie porastov kukurice prípravkami HENIK EXTRA OD, BARRACUDA a OCEAL

## NÁVOD NA POUŽITIE :

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
kukurica	dvojkľúčolistové buriny, ježatka kuria	1 l	AT	PRE

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.