

PROTIKON 250 EC

PROTIKON 250 EC® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.



Fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC), určený na ochranu pšenice a repky proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:
prothioconazole 250 g/l
(24,6 % hm)

BALENIE:
5 l HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

PROTIKON 250 EC je systémový prípravok s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.

Prípravok je určený na aplikáciu plošnými samohybnnými alebo ťahanými postrekovačmi.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Pšenica ozimná

Fuzariózy báz stebiel, fuzariózy klasov, steblolam, múčnatka trávová, septorióza plevová, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza ražná

Dávka vody: 200 - 300 l/ha

Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie.

Odporučaný spôsob postreku: malé kvapky

Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po zistení prvých príznakov chorôb, na jar od fázy objavenia sa 6. odnože do začiatku kvitnutia (BBCH 26-61). Proti chorobám koreňov aplikujte prípravok od fázy začiatku predĺžovania do fázy 2. kolienka (BBCH 30-32). Proti chorobám klasov aplikujte prípravok od začiatku do konca kvitnutia (BBCH 61-69).

Septoriózy pšenice

Dávka vody: 200 – 300 l/ha

Počet ošetrení: max. 2x za vegetačné obdobie.

Odporučaný spôsob postreku: malé kvapky

Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po zistení prvých príznakov choroby, na jar od fázy objavenia sa 7. odnože, do konca klasenia (BBCH 27-59).

Interval medzi aplikáciami: minimálne 21 dní.

Raž jarná

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Počet ošetrení: max. 2x za vegetačné obdobie.

Interval medzi aplikáciami: 21 dní.

Odporučaný spôsob postreku: malé kvapky

Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po zistení prvých príznakov chorôb, na jar od fázy objavenia sa 6. odnože do konca kvitnutia (BBCH 26-69).



Fuzariózy klasov

Repka ozimná

Dávka vody: 200 - 300 l/ha

Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie.

Odporučaný spôsob postreku: malé kvapky

Biela hniloba

Prípravok aplikujte preventívne podľa signalizácie alebo ihned po zistení prvých príznakov choroby, od fázy začiatku kvitnutia do fázy plného kvitnutia (BBCH 61-65).

Čerň repková, fómová hniloba

Prípravok aplikujte preventívne podľa signalizácie alebo ihned po zistení prvých príznakov chorôb, od fázy plného kvitnutia do konca kvitnutia (BBCH 65-69).

Repka jarná

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie.

Odporučaný spôsob postreku: malé kvapky

Prípravok aplikujte preventívne alebo ihned po zistení prvých príznakov chorôb, od rastovej fázy žltého púčika do konca kvitnutia (BBCH 59-69).

NAŠE ODPORÚČANIE:

Prípravok PROTIKON 250 EC sa aplikuje predovšetkým v preventívnych aplikáciách alebo čo najskôr po objavení sa príznakov ochorenia. Hlavným aplikačným oknom v porastoch pšenice ozimnej je preventívna aplikácia

Horčica biela

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie.

Odporučaný spôsob postreku: malé kvapky

Prípravok aplikujte preventívne alebo ihned po zistení prvých príznakov chorôb, od rastovej fázy žltého púčika do konca kvitnutia (BBCH 59-69).

Mak siaty

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie.

Odporučaný spôsob postreku: malé kvapky

Prípravok aplikujte preventívne alebo ihned po zistení prvých príznakov chorôb, od fázy vzpriameneho púčika do konca kvitnutia (BBCH 59-69).

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná	fuzariózy báz stiebel, fuzariózy klasov, stebolam, múčnatka trávová, helmintosporíza pšenice (DTR), hrdza ražná, septorióza plevová, septoriózy pšenice	0,8 l	35	-
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	0,8 l	56	-
raž jarná	stebolam, fuzariózy báz stiebel, múčnatka trávová, helmintospóriová škvŕnitosť, hrdza ražná, hrdza plevová, rynchospóriová škvŕnitosť, septorióza plevová	0,8 l	35	-
repka jarná	čerň repková, biela hniloba, pleseň sivá, fómová hniloba	0,8 l	56	-
mak	biela hniloba, pleseň sivá	0,8 l	56	-
horčica biela	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	0,8 l	56	-