

RASSEL 100 SC

RASSEL 100 SC® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. zo.o.



Selektívny herbicíd so systémovým účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) určený na ošetrovanie pšenice ozimnej a tritikale ozimného proti dvojkličnolistovým burinám.

ÚČINNÁ LÁTKA:
florasulam 100 g/l

BALENIE:
1 IHDPE fľaša

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

Prípravok obsahuje účinnú látku florasulam, ktorá patrí do skupiny inhibítorov acetolaktát syntázy (ALS). V rastline dochádza k inhibícii syntézy rozvetvených aminokyselín, čo vedie k poruchám biosyntézy bielkovín. Do rastliny je prijímaný cez listy a rýchlo translokovaný v celej rastline. Krátko po ošetrovaní inhibuje rast a vývoj burín.

Za optimálnych podmienok počasia (vyššia teplota a vlhkosť vzduchu) dochádza k celkovému úhynu burín po 7-10 dňoch. V prípade nízkych teplôt (cca 4 °C) dochádza k celkovej likvidácii citlivých burín približne po 3 týždňoch.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, mak vlčí, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, výmrav repky, kapsička pastierska, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny: hluchavka objímavá, mrlík biely
Odolné buriny: fialka roľná, veronika roľná, veronika perzská

POKYNY PRE APLIKÁCIU :

Pšenica ozimná

Dávka vody: 200-300 l/ha.

Odporúčaná metóda postreku: kvapky strednej veľkosti.

Počet ošetrovaní: max. 1x za vegetačné obdobie.

Termín aplikácie: prípravok aplikujte od rastovej fázy 3 listov do fázy 1. kolienka (BBCH 13-31).

Tritikale ozimné

Dávka vody: 200-300 l/ha

Odporúčaná metóda postreku: kvapky strednej veľkosti

Počet ošetrovaní: max. 1x za vegetačné obdobie.

Termín aplikácie: prípravok aplikujte od fázy objavenia sa 4. odnože do fázy 1. kolienka (BBCH 24-31).

V čase postreku by mali byť dvojkličnolistové buriny v rastovom štádiu 2-6 listov (BBCH 12- 16).

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:

Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia v pôde rozloží bez rizika pre následné plodiny. V prípade, že sa prípravkom ošetrovaná pôda predčasne zaorie (v dôsledku poškodenia rastlín mrazom, chorobami alebo škodcami), po 30 dňoch od

postreku a po uskutočnení predsejbovej prípravy pôdy možno na určenom pozemku pestovať všetky druhy jarných obilnín a kukuricu.

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace porasty

NAŠE ODPORÚČANIE

Vzhľadom ku skutočnosti, že účinná látka florasulam v prípravku RASSEL 100 SC pracuje i za nižších teplôt je ideálnou voľbou pre jarné herbicídne ošetrovanie ozimných obilnín. Spoločne s prípravkom SUPERHERB 20 SG (metsulfuron) poskytuje komplexnú ochranu proti dvojkličnolistovým burinám vrátane

lipkavca obyčajného a spodného poschodia burín. Navyše účinná látka metsulfuron sa vyznačuje reziduálnym efektom s kontrolou prípadných klíčiacych burín. Pre rýchlejšiu penetráciu účinných látok odporúčame pridať zmáčadlo ASYSTENT +.



Zdroj: INNVIGO, PL

NÁVOD NA POUŽITIE :

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojkličnolistové buriny	0,05 l	AT	-

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.