

UREAFIN NBPT



UREAFIN je pomocná látka, ktorá inhibuje aktivitu enzymu ureáza a tým spomaľuje rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu.

ZLOŽENIE:

NBPT (N-(n-butyl) triamid kyseliny thiofosforečnej) v % 25

BALENIE:

10 l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

UREAFIN NBPT (inhibítorm ureázy) je predovšetkým určený pre použitie s koncentrovanými kvapalnými hnojivami typu DAM a SAM, SADAM a pod. respektívne k vodným roztokom močoviny, ku ktorým sa pridáva tesne pred foliárnou aplikáciou.

Zmes s hnojivami typu DAM, SAM a pod., môže byť bez zníženia účinnosti použitá do 7 dní od pridania prípravku. V prípade koncentrovaného hnojiva s obsahom fosforu je potrebné zmes vystriekať do 1 dňa po namiešaní. UREAFIN NBPT okrem aplikácie s kvapalnými hnojivami môže byť použitý k rovnomernému naneseniu na povrch granúl pevných hnojív s obsahom amidického dusíku bez

následného zapravenia do pôdy. Odporúčané množstvo prípravku sa rovnomerne nanesie na povrch granúl tuhých hnojív obsahujúcich močovinový dusík a to najdlhšie 120 dní pred samotnou aplikáciou. Ďalšou možnosťou aplikácia prípravku

UREAFIN NBPT je na rozmetanú granulovanú močovinu. Najvyššia účinnosť prípravku je dosiahnutá bezprostrednou aplikáciou po rozmetaní močoviny.

Aplikáciou prípravku UREAFIN NBPT spoločne s N hnojivami sa zvyšuje využiteľnosť dusíka rastlinou v priemere o 10-15%.

POKONY PRE APLIKÁCIU:

Odmerané množstvo prípravku UREAFIN NBPT nalejte do postrekovača naplneného do 1/3 objemu. V prípade cisterien s čerpadlom sa prípravok UREAFIN NBPT napíňa ako prvý. Pre najvyššiu účinnosť je potrebné zabezpečiť

vhodné trysky aby sa zabezpečilo maximálne pokrytie.

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE:

Ošetrované hnojivo	Dávka UREAFIN NBPT
DAM 390	0,9 – 1,4 l/m ³
SAM	0,8 – 1,0 l/m ³
močovina	1,6 – 3,0 l/t
močovina roztok	1,6 – 3,0 l/t