

ZORRO 300 SL

ZORRO 300 SL® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp.z o.o.



ZORRO 300 SL je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určeného na ničenie jednoročných a trvácich dvojkličnolistových burín v repke ozimnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:
picloram 300 g/l

BALENIE:
1l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

ZORRO 300 SL sa vstrebáva cez listy a korene burín a následne sa rýchlo rozvádza po celej rastline, v dôsledku čoho dochádza k jej deformácii a spomaleniu rastu, až k úplnému úhynu celej rastliny.

Za optimálnych podmienok – teplé a vlhké počasie, je efekt pôsobenia prípravku rýchlejší, pri nízkej teplote dochádza k úplnému zničeniu burín približne po 3 týždňoch. Prípravok ničí buriny najrýchlejšie vo fáze 2 – 6 listov (BBCH 12 – 16).

ZORRO 300 SL efektívne ničí lipkavec obyčajný do výšky 8 cm, rumančekovité buriny vo fáze listovej ružice. Efektivita ničenia lipkavca obyčajného závisí od hustoty porastu repky a od rastovej fázy lipkavca v priebehu ošetrovania – keď lipkavec obyčajný dosahuje výšku viac ako 8 cm v momente aplikácie alebo v prípade nižšej hustoty jarného výsevu než je optimálne – môže lipkavec znova dorastať.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Jarná aplikácia:

Dávka: 0,078 l/ha

Citlivé buriny: ruman roľný, parumanček nevoňavý, rumanček kamilkový, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, nevädza poľná

Odolné buriny: hviezdica prostredná, mak vlčí, hluchavka purpurová, fialka roľná, kapsička pastierska, veronika brečtanolistá, veronika perzská .



Nevädza poľná

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Dávka vody: 200 – 300 l/ha

Počet ošetrení: max. 1x, na jar.

Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti.

Repka ozimná


Jarná aplikácia:

Termín aplikácie: od začiatku predlžovania rastu stonky, až po fázu keď sú prítomné kvetné pupene, stále obkolesené listami (BBCH 33–50).

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:

Po riadnom zbere repky ozimnej je pestovanie následných plodín bez obmedzenia. V prípade skoršej likvidácie porastu repky ozimnej ošetrenej prípravkom ZORRO 300 SL, je možné ako náhradnú plodinu pestovať ľan, repku jarnú,

jarné obilniny a kukuricu pod podmienkou, že sa pripravok nebude používať druhý krát na tomto poli v priebehu tej istej vegetačnej sezóny. Postrekom ani úletom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!



Zdroj: INNVIGO, PL

NÁVOD NA POUŽITIE :

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
repka ozimná	dvojkľúčnolistové buriny	0,078 l	AT	

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.