

BOROHUMINE 100



Listové hnojivo s obsahom bóru ako bóretanolamín s prídavkom humínových látok.

ZARADENÉ DO ZOZNAMU VZÁJOMNE
UZNANÝCH VÝROBKOV 4836

BALENIE:
20 l kanister

pH: 7-9

ZLOŽENIE:

B 8%, humínové látky

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Používa sa na preventívne alebo kuratívne odstraňovanie nedostatku využiteľného bóru v rastlinách a ako prevencia pred stresovými podmienkami (sucho, mraz, predávkovanie chemikáliami), stimuluje tvorbu koreňových vlákien.

Obsiahnuté humínové látky, ktoré sú vo vodorozpustnej forme, pozitívne ovplyvňujú príjem živín, ktoré hnojivo obsahuje. Okrem rýchlosti ich príjmu súčasne ovplyvňujú aj

ich využitie. Zlepšujú účinnosť fotosyntézy pri nižšej intenzite svetla, čím prispievajú k vyrovnanej energetickej bilancii v rastlinách. Následkom toho sa stimuluje tvorba koreňového vlásenia a dochádza k lepšiemu príjmu živín koreňmi. K takýmto náročným plodinám patria: repka, mak, slnečnica, sója, cukrová repa, jadrové ovocie, vinič a okrasné kvetiny.

DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE:

Plodina	Dávka/ha	Obdobie aplikácie	Počet aplikácií
repka ozimná	2-3 l	1. aplikácia: jeseň 4 – 6 listov 2. – 3. aplikácia: na jar, až do fázy butonizácie	1-3
cukrová repa	3 l	1. aplikácia: po dokončení tvorby listovej ružice 2. aplikácia: v 14-dňovom intervale	2
mak, slnečnica, horčica	2 l	1. aplikácia: 4 – 8 listov do začiatku kvitnutia	1-2
sója	1-2 l	1. aplikácia pred kvetom	1
vinič	3 l	1. aplikácia pri otváraní púčikov 2. pri raste plodov v 14-dňovom intervale	3

Tabuľka dávkovania obsahuje iba vybrané množstvo plodín, viac informácií v etikete prípravku.