

CUPRUM 600 SC



CUPRUM 600 SC je suspenzné hnojivo používané vo vodnom roztoku určené na listovú aplikáciu. Odporúča sa najmä pre rastliny s vysokým dopytom po medi. Zabraňuje výskytu nepriaznivých zmien v plodinách spôsobených nedostatkom medi.

HNOJIVO ES

PFC 1(C)(II)(a): Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny

BALENIE:

20 l

ZLOŽENIE:

Celková meď (Cu) - 350 g/l, Oxychlorid meďnatý - 600 g/l

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA:

CUPRUM 600 SC sa používa v termínoch a dávkach odporúčaných v programoch hnojenia pre jednotlivé plodiny alebo v prípade diagnostikovaného nedostatku medi v rastlinách.

Určené na listovú aplikáciu vo forme vodného roztoku. Môže sa použiť v kombinácii s inými agrochemikáliami po vykonaní testu potvrdzujúceho miešateľnosť.

Koncentráciu roztoku a množstvo postrekovej kvapaliny

je potrebné prispôbiť potrebám jednotlivých plodín a použitej postrekovej technike. Počas striekania sa vyhýbajte vysokej úrovni slnečného žiarenia a teploty, ako aj silnému vetru, ktorý spôsobuje unášanie kvapiek.

Aplikujte hnojivo pomocou poľného alebo sadového postrekovača so stredne veľkými kvapkami. Mal by sa aplikovať rovnomerne na celé pole.

DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE:

Plodina	Dávka/ha		Termín aplikácie
	l/h	l vody	
zemiaky	1,75-2,25	200-400	Prvé ošetrovanie po úplnom vzídení, ďalšia aplikácia o 14 dní neskôr. Neaplikujte v štádiu kvitnutia
obilniny	0,5	200-300	Na jeseň a/alebo na jar, od začiatku až do konca odnožovania
paradajka paprika	1,5-1,75	500	2 týždne po výsadbe sadeníc, potom 1-3 aplikácie s odstupom 14 dní
uhorka	1,5-2	500	Po vytvorení 6 listov, potom 1-3 aplikácie s odstupom 14 dní
ostatné plodiny	0,5	500	V štádiu intenzívneho rastu a zvýšeného dopytu
hlúboviny zelenina	1,0	500-700	Až 2 aplikácie v štádiu nastavenia hlavy
cukrová repa	1,0 – 1,5	200-400	Prvé ošetrovanie po prekrývaní medziriadkov, ďalšia aplikácia po 14-21 dňoch