

# fitoBELLA N-Cu-S (20-8-11,5)



## Tekuté listové hnojivo s obsahom Cu, N a S.

### HNOJIVO ES

PFC 1(C)(l)(b)(i): Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

### BALENIE:

20 l kanister

pH: 8-9

## ZLOŽENIE:

N 200 g/l, SO<sub>3</sub> 115 g/l, Cu 80 g/l (EDDHSA chelát)

## ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA:

fitoBELLA N-Cu-S je listové hnojivo určené k listovej aplikácií k odstráneniu deficitu medi a k pokrytiu nárokov na príjem medi plodinami, najmä jarnými a ozimnými obilninami, kukuricou a okopaninami. Med' je nevyhnutá pri počiatočnom raste plodín nakoľko účinkuje ako aktivátor niektorých enzýmov. Je súčasťou procesu tvorby a stabilite chlorofylu a veľmi dôležitá je v procese respirácie.

### Síra v rastlinách

Zlúčeniny síry sa významne podielajú na kvalite rastlinných produktov, mnohé z nich sú prekuryzory vonných a chuťových

látok. Tieto zlúčeniny majú antimikrobionálne, antioxidačné a antikarcinogénne účinky a pôsobia priaznivo na ľudský organizmus.

### Nedostatok síry

- zníženie obsahu energetických zložiek rastlín, škrobu, cukrov a pod.,
- nižšia produkcia hlavných zložiek,
- nižšia kvalita a nutričná hodnota rastlín,
- pokles úrody.

## DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE:

Plodina	Dávka/ha	Termín aplikácie	Počet aplikácií
obiliny	0,5–1,5 l	od 2. listu do konca steblovania (DC 12–39).	2–3
kukurica	0,5–1,5 l	od 2. do 10. listu (DC 12–30).	1–2
repka	0,5–1,6 l	vo fáze predĺžovacieho rastu až butonizácie (DC 30–59).	1–2
okopaniny	0,4–1,8 l	do zapojenia porastu (DC 20–45).	1–2
mak	0,3–1,2 l	od 6.listu do fázy začiatku kvitnutia (DC 16–50).	1–2
strukoviny	0,5–1,6 l	od 2. listu do fázy začiatku kvitnutia.	1–2
ostatné	0,4–1,5 l	vždy pri zistení deficitu medi, v závislosti na jeho hĺbke.	1–2

Tabuľka dávkowania obsahuje iba vybrané množstvo plodín, viac informácií v etikete prípravku.