

HERBICÍDNE OŠETRENIE REPKY OZIMNEJ



"Trojitá bariéra ochrany"

METAX ULTRA (PRE)

- Eliminácia burín od počiatočného vývoja z rôznej hĺbky pôdy
- Efektívna kontrola ťažšie ničiteľných burín
- Istota účinku i napriek suchu
- Špecialista na LIPKAVEC
- Kontrola sekundárneho zaburinenia
- Dlhá reziduálna účinnosť

DÁVKA: Clomazone (72 g) ; Metazachlor (500 g); Napropamid (500g)



"Nemôžete aplikovať metazachlór? Riešením je EFECTOR ALT/ EFECTOR ULTRA!"

EFECTOR ALT/ EFECTOR ULTRA (PRE)

- Ničí dvojkličnolistové buriny
- Vysoká koncentrácia účinnej látky
- Nízke dávkovanie
- Silne potláča výmrvm obilnín

DÁVKA: EFECTOR ALT, Clomazone (72 g); Napropamid (750 g)

DÁVKA: EFECTOR ULTRA, Clomazone (72 g); Napropamid (1000 g)



"Trávovité buriny pod dohľadom."

BILOXA (POST) NOVINKA !!!

V prípade výskytu **výdrvu obilnín** jednoznačne odporúčame aplikáciu prípravku BILOXA. Obsahuje 2 účinné látky – clethodim (140 g/l) a quizalofop-P-ethyl (70 g/l)

DÁVKA: výmrvm obilnín, citlivé jednorôčné jednokličnolistové buriny: 0,35-0,5 l

Pre zabezpečenie aktívnej ochrany koreňa a rastliny pred primárnymi infekciami chorôb odporúčame...

PROMETHEUS CZ/ HIRUNDO

V čase aplikácie graminicídu odporúčame aplikovať i bakteriálne prípravky **PROMETHEUS CZ a HIRUNDO**. **Sprístupňovanie a uvoľňovanie živín** je ďalšou z výhod ich aplikácie. Živiny repka v skorých rastových fázach nevie načerpať pre nedostatočne rozvinutý koreň.

