

# Využitie rôznych účinných látok v efektívnej morforegulácii repky na jeseň

Aktuálny stav repky ozimnej sa líši v rôznych oblastiach. Môžeme pozorovať repky v klíčnych listoch a repky vo fáze až 6-8 listov.

Na základe výdatných zrážok na celom území Slovenska očakávame intenzívny rast repky a preto je potrebné k morforegulácií pristúpiť od 4. pravého listu repky. V prípade, že repka je už vo vyššom rastovom štádiu, tak je okamžitá aplikácia morforegulačného vstupu o to viac dôležitá !

Pre správne prezimovanie repky bez poškodenia, je potrebné zvoliť správnu reguláciu. **Nás systém ošetrenia preto máme rozdelený na 2 vstupy:**



## 1. KROK

### **FLORONE + RETABELLA 750 SL**

Ošetrenie vykonávame vo fáze 4-5 listov.

Je to spojenie syntetického regulátora a prírodného produktu orone, kde táto kombinácia účinne inhibuje rast nadzemnej časti a výrazne zväčšuje objem koreňa.

**FLORONE, dávka 0,4 L/Ha** - regulátor na prírodnej báze (aminokyseliny, cytokiníny, N, P, K, B, Mo, organický materiál)

**RETABELLA 750 SL, dávka 1,0 - 1,5 L/Ha** - chlormeqat 750 g/l (v závislosti na intenzite pestovania)

## 2. KROK

### **BUKAT 500 SC**

Ošetrenie vykonávame vo fáze 6-8 listov. Bukat 500 SC s účinnou látkou tebuconazole (500 g/l) poskytuje morforegulačný a zároveň i fungicídny účinok voči chorobám repky, najmä najčastejšie sa vyskytujúcej fómovej hnilobe.



**BUKAT 500 SC, dávka 0,4 L/Ha**