

# Krátenie repky ozimnej v aktuálnych podmienkach

## PRE VYROVNANÝ PORAST I KVITNUTIE



Vzhľadom na skorý začiatok jarnej sezóny sa porasty repky vplyvom teplého počasia nachádzajú v rôznych vývojových štádiách. Všeobecne však môžeme povedať, že vyššie teploty spôsobujú predlžovanie hlavného terminálu rýchlejšie, ako by sme si predstavovali. Preto je vhodné pristúpiť ku kráteniu repky (podľa regiónov a vývojovej fázy) vhodnými prípravkami nasledovne:

### BUKAT 500 SC

Pri výbere prípravku **BUKAT 500 SC** rozhodla jeho **formulácia SC**, ktorá **je šetrnejšia ku kultúrnej plodine, nemá tak razantný nástup a funguje dlhodobejšie**. Účinná látka *tebuconazole* (500 g/l) **okrem krátenia poskytuje zároveň i fungicídny účinok** voči širokému spektru hubových chorôb.

**BUKAT 500 SC dávka: 0,5 l/ha**

### REGULATO 300 SL

Druhou voľbou pre krátenie je aplikácia prípravku **REGULATO 300 SL** s obsahom účinnej látky *mepiquat-chlorid* (300 g/l), ktorý poskytuje krátenie, avšak bez fungicídneho účinku. Prípravok pozitívne vplyva i na dĺžku a objem koreňovej sústavy.

- pozitívny vplyv na dĺžku a objem koreňovej sústavy
- redukcia rastu
- zvýšenie odolnosti voči poliehaniu

**REGULATO 300 SL dávka: 0,6 - 0,7 l/ha**



## FLORONE

V neposlednom rade v tomto období je vhodnou voľbou prípravok **FLORONE** s obsahom aminokyselín, cytokynínov, NPK a mikroelementov. **FLORONE** ako inhibítor vegetatívneho rastu **pozitívne vplýva na vyrovnanie porastu** a čo je najhlavnejšou devízou, **pozitívne ovplyvňuje generatívne orgány, plodiny s vyšším počtom šesťúľ, semien čo vedie k zvýšeniu úrody.**

**FLORONE dávka: 0,2 - 0,4 l/ha**

**! NEZABUDNITE !** Pre naštartovanie energetického metabolizmu rastlín aplikovať **AMINOCAT 30** v dávke **0,2 - 0,3 l/ha.**