

# RINCON 25 SG

RINCON 25 SG® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.



**Herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, ktorý je určený na postemergentné ničenie tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici a zemiakoch.**

**ÚČINNÁ LÁTKA:**  
rimsulfuron 250 g/kg

**BALENIE:**  
300 g HDPE fľaša

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

RINCON 25 SG je selektívny systémový herbicíd. Prípravok je prijímaný hlavne listami a rýchlo translokovaný v rastline, pričom brzdí rast a vývoj burín; má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní.

Príznaky poškodenia sú viditeľné o 3 - 10 dní po ošetrení

a väčšina burín hynie v priebehu 2 - 3 týždňov. Prípravok najlepšie pôsobí na jednorocné buriny vo fáze 2 - 3 listov. Pýr plazivý by mal mať v čase aplikácie prípravku 5 - 7 listov ( 15 - 25 cm ).

## SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

**Citlivé buriny:** hviezdica prostredná, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

**Stredne citlivé buriny:** nevädza poľná, ježatka kuria, parumanček nevoňavý, pýr plazivý.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU:

**Odporučané množstvo vody:** 200 - 300 l/ha.

**Počet ošetrení:** max. 1 x za vegetačné obdobie.

Ošetrujte pri teplote 10 - 25°C. RINCON 25 SG neaplikujte v dobe, keď počas 24 hodín dochádza k poklesu teplôt z +30°C na +5°C a nižšie.

## KUKURICA

Rincon 25 SG aplikujte postemergentne od prvého do siedmeho listu kukurice (BBCH 10 - 17). Pre zlepšenie účinku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom ASYSTENT + v súlade s návodom na použitie. Nepoužívajte RINCON 25 SG v cukrovej a osivovej kukurici!



Porast kukurice ošetrenej RINCON TOTAL (RINCON 25 SG + RUMEZO 200 SE + dicamba).

## ZEMIAKY

Rincon 25 SG aplikujte od výšky 5 cm zemiaka do zapojenia porastu (BBCH 30).

Pre zlepšenie účinku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom v súlade s návodom na použitie. Nepoužívajte v množiteľských porastoch zemiakov! Prípravok neaplikujte v porastoch kukurice a zemiakov, ktoré boli ošetrované pôdnymi insekticídmi zo skupiny organofosfátov (terbufos)

a skôr ako 7 dní od aplikácie (na listy) insekticídu zo skupiny organofosfátov. Nepoužívajte organofosfátové insekticídy skôr ako o 4 dni po aplikácii RINCON 25 SG.

Neaplikujte prípravok na rastliny oslabené a poškodené mrazom, suchom, vodou, ktorá sa drží na poliach, škodcami, chorobami a na rastliny, ktoré majú nedostatok živín. Silný dážď do 4 hodín po aplikácii môže znížiť účinok prípravku.

## VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:

Prípravok nie je nebezpečný pre následné plodiny pri štandardnom striedaní plodín. V prípade ak je nutná skoršia likvidácia plodiny, možno po uskutočnení orby a prípravy pôdy pred sejbou ako náhradnú plodinu pestovať kukuricu, zemiak alebo rajčiak. Tri mesiace po ošetrení zemiakov

nemožno pestovať kapustu, šošovicu, hrášok, slnečnicu, repu, uhorky, lucernu.

Dbajte na to, aby prípravok neboli pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých polnohospodárskych plodín.

## NAŠE ODPORÚČANIE:

Prípravok RINCON 25 SG ako špecialista na trávovité buriny pokrýva i značnú časť spektra dvojklíčnolistových burín. Práve z tohto dôvodu je našim hlavným produkтом pre ePOST alebo POST herbicídne ošetrenia kukurice doplnené prípravkom RUMEZO 200 SE (mesotrione) vyznačujúci sa

reziduálnym pôsobením. Pre zachovanie dlhšej reziduálnej účinnosti odporúčame pridať pôdne zmáčadlo VIGO.

Účinná látka rimsulfuron nevykazuje rezistenciu na ježatku, z tohto dôvodu je spoločnou voľbou pri výskytu tejto buriny.



Políčko kukurice ošetrené prípravkami TUDOR 114 OD 0,5 l/ha + RINCON 25 SG 30 g/ha (Deň pola Urbanowice, PL)



## NÁVOD NA POUŽITIE :

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
kukurica	jednorocné a trvace travy, dvojklíčnolistové buriny	60 g	-	-
zemiaky	jednorocné a trvace travy, dvojklíčnolistové buriny	60 g	-	-

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.