

TIFF 040 OD

TIFF 040 OD® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.



Selektívny systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) na ochranu kukurice proti burinám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

thifensulfuron-methyl 40 g/l

BALENIE:

1 l HDPE fľaša

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

TIFF 040 OD obsahuje účinnú látku, ktorá sa zaraďuje k inhibítom enzýmu ALS (acetolaktát syntetáza), čo spôsobuje blokovanie syntézy aminokyselín s rozvetveným reťazcom a súčasne bielkovín, čo v konečnom dôsledku vedie k spomaleniu rastu a vývinu burín.

Prípravok je prijímaný hlavne listami a rýchlo translokovaný

v rastline, pričom brzdí rast a vývoj burín. Herbicídny účinok možno pozorovať v priebehu 14-20 dní od aplikácie prípravku. Najefektívnejšie pôsobí na mladé, intenzívne rastúce buriny v rastovej fáze 4-6 listov. Vykazuje aktívnu selektivitu - rastliny kukurice majú schopnosť rozkladania prípravku na neaktívne zlúčeniny.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, mrlík biely, parmanček nevoňavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, ruman roľný, rumanček kamilkový, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: fialka roľná, pohánkovec ovíjajú, stavikrv vtáčí, žltica maloubořová.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Dávka vody: 200-300 l/ha.

Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie.

Odporúčaný spôsob postreku: kvapky strednej veľkosti.

Termín aplikácie: prípravok aplikujte na jar, od fázy 1 do 7 listov kukurice (BBCH 11-17).



Rastliny kukurice bez konkurencie burín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:

Vzhľadom na krátke reziduálne pôsobenie v pôde je možné pestovať v tom istom roku po aplikácii herbicídu TIFF 040 OD akúkoľvek plodinu bez obmedzenia. V prípade predčasného zaorania porastu možno po uplynutí 1 mesiaca opäť pestovať kukuricu. Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na

výsev, alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín. Cibula je na prípravok TIFF 040 OD obzvlášť citlivá, preto dodržujte ochrannú vzdialenosť 5 m od postrekovanej plochy.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry!

NAŠE ODPORÚČANIE:

Prípravok TIFF 040 OD (thifensulfuron-methyl) v kombinácii s prípravkom STAPLER (2,4 D) je vhodnou alternatívou pre ošetrovanie porastov kukurice z hľadiska spektra účinku i ekonomického aspektu riešenia. Kombinácia pokrýva široké spektrum dvojklíčnolistových burín vrátane ťažko ničiteľných burín. V tomto prípade olejová OD formulácia zvyšuje účinnosť - nie je potrebné dopĺňať zmáčadlo.



Mrlík biely

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
kukurica na zrno*	dvojklíčnolistové buriny	0,27 l	AT	

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.