

CUPROTE



Hnojivo s vysoko vstrebateľným komplexom medi, ktorý sa ako mikroelement vyskytuje v mnohých enzymatických procesoch, najmä pri produkcii fytoalexínov a syntéze lignínu.

HNOJIVO ES

PFC 1(C)(II)(a): Jednozložkové anorganické hnojivo s mikroživinami

REGISTRAČNÉ ČÍSLO: EU0959

BALENIE: 20 l kanister

pH: 4-4,8

ZLOŽENIE:

Minerálne hnojivo s obsahom mikroživiny v roztoku 7% Cu

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA:

PŠENICA, JAČMEŇ, OVOS, TRITIKALE, RAŽ:

Termín aplikácie: od fázy odnožovania do konca fázy klasenia.

Dávkovanie: 1-3 l/ha.

Odporúčané množstvo vody: 150-300 l/ha.

REPKA:

Termín aplikácie: na jeseň, v štádiu 4-6 listov repky (BBCH 14-16), na jar po začiatku vegetácie na začiatku fázy predlžovania hlavných výhonkov (BBCH 32-35).

Dávkovanie: 1-3 l/ha.

Odporúčané množstvo vody: 150-300 l/ha.

KUKURICA:

Termín aplikácie: od začiatku predlžovacieho rastu (BBCH 30) do začiatku kvitnutia kukurice (BBCH 61).

Dávkovanie: 1-3 l/ha.

Odporúčané množstvo vody: 150-300 l/ha.

CUKROVÁ REPA:

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha.

Odporúčané množstvo vody: 150-300 l/ha.

Poznámky: možná aplikácia s fungicídmi vo fáze prekrytia medziriadkov.

ZEMIAK:

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha.

Odporúčané množstvo vody: 200-500 l/ha.

Termín aplikácie: Aplikujte od začiatku zakrývania medziriadkov až do začiatku žltnutia listov (BBCH 31-91).

Poznámky: Pri silne vyvinutých zemiakových listoch použite vyššiu dávku prípravku.

JABLOŇ:

Termín aplikácie: Na začiatku vegetácie, najneskôr do fázy zeleného púčika (BCH 56):

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha.

Odporúčané množstvo vody: 400 – 800 l/ha.

Termín aplikácie: Od nasadzovania plodov (BBCH 71) do 21 dní pred zberom:

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha.

Interval medzi aplikáciami: 5-10 dní.

Odporúčané množstvo vody: 800-1000 l/ha.

Poznámky: V závislosti od citlivosti odrody na hnojivá s obsahom medi môže dôjsť k hrdzaveniu plodov.

VIŠŇA, ČEREŠŇA:

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha.

Odporúčané množstvo vody: 800-1000 l/ha.

Aplikujte v období kvitnutia (BBCH 59 – 69).

DROBNÉ OVOCIE (JAHODA, MALINA):

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha.

Interval medzi aplikáciami: 5-10 dní.

Odporúčané množstvo vody: 500-700 l/ha.

Prvé ošetrovanie vykonajte až po vyvinutí dostatočného množstva listov a aplikujte až do konca zberu.

UHORKA (PRI PESTOVANÍ NA POLI I V SKLENÍKU):

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha.

Odporúčané množstvo vody: 700 l/ha.

Termín aplikácie: Prípravok používajte podľa potreby vo fázach (BBCH 21 – 89).

PARADAJKA (PRI PESTOVANÍ NA POLI I V SKLENÍKU), PAPRIKA (PRI PESTOVANÍ NA POLI I V SKLENÍKU):

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha.

Interval medzi aplikáciami: 5-10 dní.

Odporúčané množstvo vody: 700 l/ha.

Prvé ošetrovanie vykonajte ihneď po vysadení rastlín. Ošetrovania opakujte podľa potreby od vývojovej fázy prvých bočných výhonkov (BBCH 21) až do 3 dní pred zberom.

KAPUSTOVÁ ZELENINA:

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha

Interval medzi aplikáciami: 5-10 dní.

Odporúčané množstvo vody: 500-700 l/ha.

Prvé ošetrovanie vykonajte po zakorenení sadeníc. Ošetrovanie opakujte podľa potreby, najneskôr do 3 dní pred zberom.

KOREŇOVÁ ZELENINA:

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha

Interval medzi aplikáciami: 5-10 dní.

Odporúčané množstvo vody: 500-700 l/ha.

Prvé ošetrovanie vykonajte po rozvinutí 3. listu a pokračujte podľa potreby až do konca vegetačného obdobia.

DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE:

Plodina	Dávka/ha
obilniny jarné i ozimné, repka, kukurica, cukrová repa, zemiak, jabloň, višňa, čerešňa jahoda, malina, uhorka, paradajka, paprika kapustová zelenina, koreňová zelenina	1-5 l
hnojenie	1-3 l