

TREGUS 500 EC

TREGUS 500 EC® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o. o.



TREGUS 500 EC je regulátor rastu rastlín vo forme emulzného koncentráту (EC). Prípravok sa používa na skrátenie stebľa a k zvýšeniu odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej, tritikale, raže ozimnej, jačmeňa ozimného a jačmeňa jarného pestovaných v intenzívnych technológiách s vysokou úrovňou dusíkatého hnojenia.

ÚČINNÁ LÁTKA:

trinexapac-ethyl v obsahu 500 g/l

BALENIE:

5 l HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy gibberelínov. Prípravok je prijímaný hlavne listami a stonkami rastlín a je rýchlo translokovaný do meristematických pletív, čím sa zabráni nadmernému predlžovaniu internódií. Skrátenie a spevnenie internódií zvyšuje odolnosť proti

poliehaniu. Intenzita účinku závisí od vývojovej fázy plodiny, odrody, polohy a poveternostných podmienok. Najvýraznejšie skrátené sú internódiá, ktoré v čase aplikácie intenzívne rastú.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

PŠENICA OZIMNÁ

Dávka vody: 200-300 l/ha.

Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie.

Termín aplikácie: Prípravok aplikujte pri jednorazovej aplikácii od rastovej fázy začiatku predlžovania stebľa (BBCH 30) do rastovej fázy vyvinutého vlajkového listu (BBCH 39).

Prípravok je možné aplikovať aj v delenej aplikácii:

Prvé ošetrenie: 0,15 l/ha.

Druhé ošetrenie: 0,15 l/ha.

Počet ošetrení: max. 2x za vegetačné obdobie.

Interval medzi aplikáciami: 7-25 dní.

Prvé ošetrenie vykonajte od konca odnožovania do fázy viditeľného tretieho kolienka (BBCH 29-33) a nasledujúce ošetrenie od fázy viditeľného tretieho kolienka do fázy vyvinutého vlajkového listu (BBCH 33-39).

TRITIKALE

Dávka vody: 200-300 l/ha.

Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie.

Termín aplikácie: Prípravok aplikujte od fázy začiatku predlžovania stebľa (BBCH 30) do fázy viditeľného šiesteho kolienka (BBCH 36).

RAŽ OZIMNÁ

Dávka vody: 200-300 l/ha.

Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie.

Termín aplikácie: Prípravok aplikujte pri jednorazovej aplikácii od konca fázy odnožovania do fázy viditeľného siedmeho kolienka (BBCH 29-37).

Prípravok je možné aplikovať aj v delenej aplikácii:

Prvé ošetrenie: 0,15 l/ha.

Druhé ošetrenie: 0,15 l/ha.

Počet ošetrení: max. 2x za vegetačné obdobie.

NAŠE ODPORÚČANIE:

Trinexapack-ethyl, TREGUS 500 EC v systéme morforegulácie obilnín zabezpečuje skrátenie a spevnenie stebiel obilnín vedúce k zvýšeniu odolnosti proti poliehaniu. Účinok aplikácie je závislý na rastovej fáze, odrode, polohe a poveternostných podmienkach. V prípade zamračených dní sa účinok výrazne znižuje.

Nové poznatky z pokusov ukazujú, že aplikácia REGULATO 300 SL v BBCH 29 - 30 a následná aplikácia TREGUS 500 EC v BBCH 32 má pozitívny efekt nie len na zvýšenie odolnosti porastu proti poliehaniu, ale silno podporuje i rozvoj koreňového systému.



BBCH 32

NÁVOD NA POUŽITIE :

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná	skrátenie stebľa, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,2 l T1: 0,15 l T2: 0,15 l	AT	DA
tritikale	skrátenie stebľa, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,3 l	AT	-
raž ozimná	skrátenie stebľa, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,15 l T1: 0,15 l T2: 0,15 l	AT AT	DA
jačmeň ozimný	skrátenie stebľa, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,3 l	AT	-
jačmeň jarný	skrátenie stebľa, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,2 l	AT	-

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi terminom aplikácie a zberom.