

THIOPRON®

THIOPRON® je obchodná známka spoločnosti UPL Holdings Coöperatief U.A.



Kontaktný fungicíd s preventívnym účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), ktorý sa používa na ochranu proti múčnatke trávovej v obilninách a múčnatke repovej v repe cukrovej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Sulphur (síra) 825 g/l
(57,3 % hm)

BALENIE:

10 l HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

THIOPRON je kontaktný fungicíd s preventívnym účinkom, s rýchlym nástupom účinku a reziduálnym pôsobením proti hubovým patogénom zo skupiny múčnatiek. Spôsob účinku

spočíva v inhibícii dýchania, v prerušovaní tvorby proteínov a vo vnútri buniek húb spôsobuje spomalenie klíčenia spór a rast hýf.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

OZIMNÉ A JARNÉ OBILNINY

Dávka vody: 200-400 l/ha

Počet ošetrení: max. 2x za vegetačné obdobie.

Interval medzi aplikáciami: 7-21 dní

Prípravok aplikujte na potlačanie múčnatky v čase infekčného tlaku choroby alebo pri výskyte prvých príznakov, vo fenologickej fáze od 5. rozvinutého listu po koniec kvitnutia (BBCH 15 - 69).

REPA CUKROVÁ

Dávka vody: 200-600 l/ha

Počet ošetrení: max. 2x za vegetačné obdobie.

Interval medzi aplikáciami: 7-14 dní

Prípravok aplikujte vo fenologickej fáze, keď riadky celkom zapojené, po fázu keď koreň repy dosiahne zberovú zrelosť (BBCH 39 - 49).

Prípravok aplikujte pri teplote +15 °C - +25 °C, v prípade aplikácii pri teplote vzduchu vyššej ako +25 °C sa môžu vyskytnúť prejavy fytotoxicity.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:

Pri používaní v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na následné plodiny.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry!



Zdravý porast až po klas



Dôležitosť ochrany listovej plochy

NAŠE ODPORÚČANIE:

Prípravok Thiopron prináša do spoločných TMixov s funicídnyimi prípravkami synergický efekt, ktorý zabezpečí: účinnú a udržateľnú ochranu, komplexnejšie spektrum aktivity účinných látok, výrazné zvýšenie anti-rezistentnej ochrany, najnovšiu tekutú formuláciu obsahujúcu Xanthan - prírodnú látku zabezpečujúcu dlhodobjšiu účinnosť a lepšiu ochranu proti zmyvu dažďom a v neposlednom rade dodávku dôležitého makroprvku Síry.

Thiopron je vhodné aplikovať do každej rastovej fázy plodiny v odporúčaných dávkach. Registrácia prípravku je proti múčnatke trávovej, avšak pokusy ukázali konzistentné posilnenie účinnosti konvenčných fungicídov. Thiopron posilňuje účinnosť proti múčnatke, septoriozám a hrdziam. Rovnako redukuje výskyt klasových ošetrov. Je vhodným prípravkom pre prvé sanitárne riešenia plodín po zime.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, tritikale, raž jarná, raž ozimná	múčnatka trávová	5 – 7,5 l	AT	-
repa cukrová	múčnatka repová	5 – 7,5 l	AT	-

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.